

รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

เรื่อง

การจัดการอินทรีย์วัตถุในดินเพื่อการผลิตข้าวโพดหวาน
ในระบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสตูล

Soil Organic Matter Management for Sweet Corn Production
in Organic Agriculture System, Sutun Province

โดย

นางสาวรัตนากรณ์ เพชรจำรัส
นางพิมล อ่อนแก้ว
นางสาวสุภาวดี เรืองกุล

ทะเบียนวิจัยเลขที่ 62 63 05 08 010014 024 107 14 11
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มิถุนายน 2564

สารบัญ

	หน้า
สารบัญตาราง	i
สารบัญตารางภาคผนวก	ii
สารบัญภาพ	iii
สารบัญภาพภาคผนวก	iv
บทคัดย่อ	2
Abstract	3
หลักการและเหตุผล	4
วัตถุประสงค์	5
การตรวจเอกสาร	5
ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ	11
อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ	12
ผลการวิจัยและวิจารณ์	15
สรุปผลการทดลอง	32
ข้อเสนอแนะ	32
ประโยชน์ที่ได้รับ	33
การเผยแพร่ผลงาน	33
เอกสารอ้างอิง	34
ภาคผนวก	36

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 ค่า C/N ratio ของสัดอินทรีย์บางชนิด	6
2 ผลการวิเคราะห์ดินและระดับความอุดมสมบูรณ์ของชุดดินลำภูราดิน	7
3 การสืปุยข้าวโพดหวานตามอัตราของค่าวิเคราะห์ดิน	8
4 ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินก่อนและหลังการทดลองปีที่ 1 และปีที่ 2	16
5 ปริมาณอินทรีย์ต่ำในดินก่อนและหลังการทดลองปีที่ 1 และปีที่ 2	17
6 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินก่อนและหลังการทดลองปีที่ 1 และปีที่ 2	18
7 ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินก่อนและหลังการทดลองปีที่ 1 และปีที่ 2	19
8 ปริมาณแคลเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินก่อนและหลังการทดลองปีที่ 1 และปีที่ 2	20
9 ปริมาณแมกนีเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินก่อนและหลังการทดลองปีที่ 1 และปีที่ 2	21
10 ความสูงต้นข้าวโพดหวานปีที่ 1 และปีที่ 2	22
11 น้ำหนักผลผลิตทั้งเปลือกต่อไร่ของข้าวโพดหวานปีที่ 1 และปีที่ 2	24
12 น้ำหนักผลผลิตปอกเปลือกต่อไร่ของข้าวโพดหวานปีที่ 1 และปีที่ 2	25
13 ขนาดความยาวฝักข้าวโพดหวานปีที่ 1 และปีที่ 2	27
14 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฝักข้าวโพดหวานปีที่ 1 และปีที่ 2	28
15 ค่าความหวานของเมล็ดข้าวโพดหวานปีที่ 1 และปีที่ 2	29
16 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจรวม 2 ปี	31
17 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ	31

สารบัญตารางภาคผนวก

ตาราง ภาคผนวกที่	หน้า
1 ผลการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ใช้ในการทดลอง ปีที่ 1	37
2 ผลการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ใช้ในการทดลอง ปีที่ 2	37
3 พิสัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินระดับสมบัติทางเคมีของดิน	37
4 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าความเป็นกรดเป็นด่างก่อนการทดลองปีที่ 1	38
5 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าความเป็นกรดเป็นด่างหลังการทดลองปีที่ 1	38
6 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าความเป็นกรดเป็นด่างก่อนการทดลองปีที่ 2	39
7 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าความเป็นกรดเป็นด่างหลังการทดลองปีที่ 2	39
8 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินก่อนการทดลองปีที่ 1	39
9 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินหลังการทดลองปีที่ 1	39
10 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินก่อนการทดลองปีที่ 2	40
11 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินหลังการทดลองปีที่ 2	40
12 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินก่อนการทดลองปีที่ 1	40
13 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินหลังการทดลองปีที่ 1	40
14 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินก่อนการทดลองปีที่ 2	41
15 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินหลังการทดลองปีที่ 2	41
16 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินก่อนการทดลองปีที่ 1	41
17 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินหลังการทดลองปีที่ 1	41
18 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินก่อนการทดลองปีที่ 2	42
19 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินหลังการทดลองปีที่ 2	42
20 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณแคลเซียมในดินก่อนการทดลองปีที่ 1	42
21 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณแคลเซียมในดินหลังการทดลองปีที่ 1	42
22 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณแคลเซียมในดินก่อนการทดลองปีที่ 2	43
23 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณแคลเซียมในดินหลังการทดลองปีที่ 2	43
24 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณแมกนีเซียมในดินก่อนการทดลองปีที่ 1	43
25 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณแมกนีเซียมในดินหลังการทดลองปีที่ 1	43

สารบัญตารางภาคผนวก

ตาราง ภาคผนวกที่		หน้า
26	ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณแมกนีเซียมในดินก่อนการทดลองปีที่ 2	44
27	ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณแมกนีเซียมในดินหลังการทดลองปีที่ 2	44
28	ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงต้นข้าวโพด ปีที่ 1	44
29	ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงต้นข้าวโพด ปีที่ 2	44
30	ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ำหนักผลผลิตข้าวโพดทั้งเปลือกต่อไร่ ปีที่ 1	45
31	ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ำหนักผลผลิตข้าวโพดทั้งเปลือกต่อไร่ ปีที่ 2	45
32	ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ำหนักผลผลิตข้าวโพดหลังปอกเปลือกต่อไร่ ปีที่ 1	45
33	ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ำหนักผลผลิตข้าวโพดหลังปอกเปลือกต่อไร่ ปีที่ 2	45
34	ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวฝักข้าวโพด ปีที่ 1	46
35	ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวฝักข้าวโพด ปีที่ 2	46
36	ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนเส้นผ่าศูนย์กลางฝักข้าวโพด ปีที่ 1	46
37	ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนเส้นผ่าศูนย์กลางฝักข้าวโพด ปีที่ 2	46
38	ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนความหวานของข้าวโพด ปีที่ 1	47
39	ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนความหวานของข้าวโพด ปีที่ 2	47

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 ภาพแสดงความสูงต้นข้าวโพด	23
2 ภาพแสดงน้ำหนักผลผลิตข้าวโพดหวานทั้งเปลือกต่อไร่	24
3 ภาพแสดงน้ำหนักผลผลิตข้าวโพดหวานปอกเปลือกต่อไร่	26
4 ภาพแสดงผลผลิตข้าวโพดหวาน (กิโลกรัม/ไร่)	30

แบบ วจ.3

แบบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ทะเบียนวิจัย 62 63 04 12 010117 024 107 17 11
 ชื่อโครงการวิจัย การจัดการอินทรีย์วัตถุในดินเพื่อการผลิตข้าวโพดหวานในระบบเกษตรอินทรีย์
 จังหวัดสตูล
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัตนารณ์ เพชรจำรัส
 หน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินสตูล สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
 ที่ปรึกษาโครงการ ผอ.เขต 12 นางจิราพรรณ ชี้ชวาลชัยพรรณ ที่ปรึกษาโครงการ
 ผู้ร่วมดำเนินงาน ผอ.สพด.สตูล นายมงคล ทองจิบ ที่ปรึกษาโครงการ
 นางพิมล อ่อนแก้ว หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
 นางสาวสุภาวดี เรืองกุล หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
 เริ่มต้น เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ.2563
 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 24 เดือน
 สถานที่ดำเนินงาน จังหวัดสตูล อำเภอควนกาหลง ตำบลทุ่งน้ำย หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหารา
 พิกัด 619037 E 763595 N ชุดดิน ลำภูรา กลุ่มชุดดิน 26
 ชนิดดิน ดินเหนียว

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ	งบบุคลากร	งบดำเนินการ	รวม
2562	-	100,00	100000
2563	-	105,000	105,000
รวม	-	205,000	205,000

แหล่งงบประมาณที่ใช้ กรมพัฒนาที่ดิน

พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดประกอบตามแบบฟอร์มที่กำหนดมาด้วยแล้ว

ลงชื่อ

(นางสาวรัตนารณ์ เพชรจำรัส)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ

(.....)

ประธานคณะกรรมการลั่นกรองผลงานวิชาการของหน่วยงานต้นสังกัด

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ทะเบียนวิจัยเลขที่ ชื่อโครงการวิจัย	62 63 05 08 010014 024 107 14 11 การจัดการอินทรีย์ตุณในดินเพื่อการผลิตข้าวโพดหวานในระบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสตูล
กลุ่มชุดดินที่ สถานที่ดำเนินงาน	Soil Organic Matter Management For Sweet Corn Production in Organic Agriculture System in Sutun Province.
หัวหน้าโครงการ	26 ชุดดินลำภูรา (Lamphu La series : LL) บ้านน้ำหารา หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควบคุมกาหลง จังหวัดสตูล
ผู้ร่วมดำเนินการ	1. นางสาวรัตนากรณ์ เพชรจำรัส Miss.Rattanaporn Petchamrat 1. นางพิมล อ่อนแก้ว Mrs.Pimol onkaew 2. นางสาวสุภาวดี เรืองกุล Miss.Supawadee Ruaengkul

บทคัดย่อ

การศึกษาผลการจัดการอินทรีย์ตุณในดินเพื่อการผลิตข้าวโพดหวานในระบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการผลิตข้าวโพดหวานในระบบเกษตรอินทรีย์ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินก่อนและหลังการทดลอง และศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าวโพดหวาน ในตัวรับทดลองต่าง ๆ ทำการทดลองในพื้นที่เกษตรกร หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหารา ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควบคุมกาหลง จังหวัดสตูล ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2563 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCBD) จำนวน 9 ตัวรับการทดลอง 3 ชั้น คือ ตัวรับที่ 1 ใส่ปุ๋ยหมักพ.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน ตัวรับที่ 2 ใส่ปุ๋ยหมักพ.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ ตัวรับที่ 3 ใส่ปุ๋ยหมักพ.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ่ยสด ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ ตัวรับที่ 4 ใส่ปุ๋ยชีวภาพ พ.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน ตัวรับที่ 5 ใส่ปุ๋ยชีวภาพ พ.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ ตัวรับที่ 6 ใส่ปุ๋ยชีวภาพ พ.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ่ยสด และน้ำหมักชีวภาพ ตัวรับที่ 7 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน ตัวรับที่ 8 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ และตัวรับที่ 9 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ่ยสดและน้ำหมักชีวภาพ การใส่ปุ๋ยแต่ละตัวรับการทดลองจะใส่ 2 ครั้ง ช่วงที่ข้าวโพดหวานมีอายุ 20 วันและ 40 วัน

ผลการศึกษาพบว่า การใส่ปุ๋ยหมัก พ.1 ปุ๋ยชีวภาพ พ.12 และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน หลังการทดลองค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปีที่ 1 ระดับค่าความกรดเป็นด่างของดินอยู่ในระดับกรดจัด มีค่าอยู่ระหว่าง 4.67 – 5.60 หลังการทดลองปีที่ 2 ค่าความเป็นกรดเป็นด่างดินของแนวโน้มลดลง แต่อยู่ในระดับกรดจัด มีค่าอยู่ระหว่าง 5.23 – 5.57 ตัวรับการทดลองที่ 1, 4 และตัวรับการทดลองที่ 7 เป็นตัวรับการทดลองที่มีสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน พบร่วงการสับตอซังข้าวโพดทำให้ดินมีปริมาณอินทรีย์ตุณ (OM) ปริมาณแคลเซียม (Ca) และปริมาณแมกนีเซียม (Mg) ในดินเพิ่มขึ้น และหลังการทดลองพบว่า ดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available K) ลดลงทุกตัวรับการทดลอง การเจริญเติบโตพบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ ปีที่ 1 ตัวรับการทดลองที่ 4 การใส่ปุ๋ยชีวภาพ พ.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน ให้ความสูงต้นสูงที่สุด 201.42 ซม. แต่ในการทดลองปีที่ 2 พบร่วง ตัวรับการทดลองที่ 1 การใส่ปุ๋ยหมักพ.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน ให้ค่าความสูงต้นสูงที่สุดเท่ากับ 130.27 ซม. ตัวรับการทดลองที่ 1, 4 และตัวรับการทดลองที่ 7 ที่การสับกลบตอซังข้าวโพดมีแนวโน้มให้ความยาวฝักยาวกว่าตัวรับการทดลองอื่น ๆ และการใส่ปุ๋ยหมักพ.1, ปุ๋ยชีวภาพ พ.12 และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ไม่มีผลต่อขนาดเส้นฝ่าศูนย์ฝักข้าวโพดหวาน การใส่ปุ๋ยหมักพ.1 และปุ๋ยชีวภาพ พ.12 มีแนวโน้มให้ค่าความหวานเม็ดสดดีกว่าตัวรับการทดลองอื่น ๆ ตัวรับการทดลองที่ 1 การใส่ปุ๋ยหมักพ.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน มีน้ำหนักผลผลิต(กิโลกรัมต่อไร่)และมูลค่า

ผลผลิตสูงที่สุดเท่ากับ 1,004.45 กิโลกรัมต่อไร่ 20,089.00 บาทต่อไร่ แต่ต่ำรับการทดลองที่ 8 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ เป็นต่ำรับการทดลองที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงที่สุด มีมูลค่าผลผลิตและผลตอบแทนเท่ากับ 17,671.80 และ 13,871.80 บาทต่อไร่

Abstract

The study of soil organic matter management for sweet corn production in organic agriculture system, Satun province aimed 1.) to study the effect of compost for sweet corn in organic agriculture systems. 2.) to study the changed of some soil chemical properties before and after experiment and 3.) to study their economic return in each treatments. The experiment was conducted in the farmer area at Moo 6 Baan Nam-ra, Thung Nui sub-district, Kuan Ka Long district, Satun province between October 2018 to September 2020. The experiment was Randomized Complete Block Design with consisted 9 treatments 3 replications. There were T1: applying LDD 1 compost at the rate of 2,000 kg/rai plowing with corn cob in the plot. T2: applying LDD 1 compost at the rate of 2,000 kg/rai combined with LDD 2 bio-extract at the rate of 1 litre/500 litres of water. T3: applying LDD 1 compost at the rate of 2,000 kg/rai combined with green manure (sun hemp) and LDD 2 bio-extract at the rate of 1 litre/500 litres of water. T4: applying LDD 12 bio-fertilizer at the rate of 300 kg/rai plowing with corn cob in plot. T5: applying LDD 12 bio-fertilizer at the rate of 300 kg/rai combined with LDD 2 bio-extract at the rate of 1 litre/500 litres of water. T6: applying LDD 12 bio-fertilizer at the rate of 300 kg/rai combined with green manure (sun hemp) and LDD 2 bio-extract at the rate of 1 litre/500 litres of water. T7: applying high content compost at the rate of 100 kg/rai plowing with corn cob in plot. T8: applying high content compost at the rate of 100 kg/rai combined with LDD 2 bio-extract at the rate of 1 litre/500 litres of water and T9: applying high content compost at the rate of 100 kg/rai combined with green manure (sun hemp) in the plot combined with plowing LDD 2 bio-extract at the rate of 1 litre/500 litres of water. Applying each type of fertilizer for 2 times when the age of sweet corn of 20 and 40 days.

The result showed that applying LDD 1 compost, LDD 12 bio-fertilizer and high content compost had some effects on the changed of some soil chemical properties after experiment. There were tended to increase soil pH in the first year of experiment which in the range of 4.67-5.60 (strongly acid). After second year experiment, there were tended to decrease soil pH but still available in the range of strongly acid which in the range of 5.23-5.57. T1, T4 and T7 which plowing corn cob in the plot tended to increase soil organic matter (O.M.), exchangeable Ca and exchangeable Mg in all of treatments. In the case of growth, the first year experiment found that T4) applying LDD 12 bio-fertilizer at the rate of 300 kg/rai plowing with corn cob in the plot highly significantly gave highest height of 201.42 centimeter while in the second year, T1 applying LDD 1 compost at the rate of 2,000 kg/rai plowing with corn cob in the plot highly significantly gave the highest height of 130.27 centimeter. T1, T4 and T7, the treatments which plowing corn cob in the plot tended to give the highest length of pod. Applying LDD 1 compost, LDD 12 bio-fertilizer and high content compost had no effect on diameter of pod. Using of LDD 1 compost and LDD 12 bio-fertilizer tended to give more sweetness than other treatments. Moreover, T1 applying LDD 1 compost at the rate for 2,000 kg/rai plowing with corn cob highly significantly gave highest yield and production values, 1,004.45 kg/rai and 20,089 baht/rai, respectively. Nevertheless, T8)

applying high content compost at the rate of 100 kg/rai combined with LDD 2 bio-extract at the rate of 1 litre/500 litres of water gave the highest economic return which the production value and economic return of 17,671.80 and 13,871.80 baht/rai, respectively.

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกระแสความนิยมของผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญกับอาหารสุขภาพมากขึ้นความปลอดภัยทางอาหารโดยไม่มีการปนเปื้อนหรือมีน้อยมากจากสารเคมี สารพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพ ทำให้การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพօอกส์ ตลาดมากขึ้น เกษตรอินทรีย์เป็นระบบการเกษตรที่เน้นการเพาะปลูกพืชที่ใช้ปุ๋ยประเทอินทรีย์เป็นหลัก เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์สามารถเพิ่มนูลค่าของผลผลิตได้เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันพบว่าพื้นที่ที่เป็นการทำการทำเกษตรแบบอินทรีย์มีน้อยมากเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างเช่น รูปแบบการผลิต กระบวนการขันตอนต่างๆในการผลิตที่ค่อนข้างยุ่งยาก เห็นผลตอบแทนช้า เป็นต้น ทำให้เกษตรกรรายย่อยมองข้ามระบบเกษตรอินทรีย์ไปโดยยังเน้นการผลิตพืชที่ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลักจนทำให้พื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกเริ่มส่งผลต่อพืชที่ปลูกให้มีต้นที่ไม่สมบูรณ์ ผลผลิตน้อยหรือหากมีการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะทำให้พื้นที่ไม่สามารถปลูกพืชได้อีก พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่องทุกปี มีผลต่อระดับความเป็นกรดของดินจากการทดลอง Tattao (1987) ในติดดอน ซึ่งเป็นดินเหนียวประสิแดง มีการใส่ปุ๋ยในตอรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอัตราต่างๆกันให้แก่ข้าวโพดที่ปลูกปีละครั้งติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปีพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระดับ pH ยิ่งต่ำเมื่อใส่ปุ๋ยมากขึ้นหากดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดอยู่แล้วการใส่ปุ๋ยทำให้ดินเป็นกรดมากขึ้น แม้จะใส่ทั้งปุ๋ยในตอรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม แต่ปุ๋ยที่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เป็นกรดคือ ปุ๋ยแอมโมเนียมชัลเฟต ส่วนปุ๋ยดับเบลชูเปอร์ฟอสเฟตและโพแทสเซียมคลอไรด์มีผลต่อความเป็นกรด-ด่างของดินน้อยมากเมื่อเทียบกับปุ๋ยแอมโมเนียมชัลเฟต (อ่านจาก, 2551) การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจเช่น ข้าวโพดหวาน ถั่วเขียว ถั่วเหลือง เป็นต้น ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ รากต่ออาหาร ความชื้นที่ยังเหลืออยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะข้าวโพดหวาน จัดเป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีและปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกข้าวโพดหวานในรูปแบบต่างๆสูงเป็นอันดับที่ 1 หรือ 2 ของโลก รองจากสร้างรัฐอเมริกา พบว่าปริมาณการส่งออกของปี 2550-2554 มีปริมาณการส่งออก 151,276 , 153,384 , 160,818 , 173,619 และ 184,178 ตัน ตามลำดับ มีการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้อุตสาหกรรมข้าวโพดหวานยังคงมีแนวโน้มที่ขยายการเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตเนื่องจาก ประเทศไทยมีผลิตและส่งออกรายใหญ่อย่าง สหราชอาณาจักร ได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกพืชพลั้งงานทดแทนและประเทศไทยมีแนวโน้มขยายความต้องการเพิ่มขึ้น รวมถึงการที่สหภาพยุโรปซึ่งเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทยมีแนวโน้มปริมาณการส่งออกลดลง เนื่องจากข้อกำหนดของมาตรการ AD (Anti Dumping) และจุดแข็งของอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานของไทยอีกอย่างคือการที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีและผลผลิตมีคุณภาพทำให้โรงงานผลิตได้ทั้งปี รวมถึงประเทศไทยแบบเชิง เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ก็มีความต้องการนำเข้าข้าวโพดหวานเข่นกับปริมาณผลผลิตข้าวโพดหวานของไทยร้อยละ 80-90 จะถูกส่งออกใน 2 ลักษณะ คือ ข้าวโพดหวานแซ่บเย็นแซ่แข็ง และข้าวโพดหวานปรุงแต่ง/แปรรูป โดยประเทศไทยคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ อังกฤษ เยอรมัน รัสเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน นอกจากข้าวโพดหวานจะเป็นพืชที่มีศักยภาพในด้านการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในระยะหลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว การนำเศษเหลือใช้ เช่นต้นข้าวโพดหวานสามารถใช้ในการประกอบลงดินเพื่อการปรับปรุงดิน หรือการนำไปเป็นอาหาร หยาบคายแทนหญ้าสัดสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ-โคนม การใช้ปุ๋ยชีวภาพจะช่วยส่งเสริมสมบัติทางกายภาพ ทำให้ดินเหนียว มีความร่วนซุย ระยะน้ำ อากาศดีดีขึ้น ปรับสภาพทางเคมีโดยลดความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ลดความเป็นพิษของโลหะหนัก ช่วยปลดปล่อยรากต่ออาหารให้เป็นประโยชน์ต่อพืช ช่วยเก็บรากต่ออาหารไว้ในดิน และดินที่มีอินทรีย์วัตถุมากพอจะด้านทานการชะล้างพังทลายของดินได้ (กรมวิชาการเกษตร, 2551)

เป้าหมายการจัดทำโครงการวิจัยศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อการผลิตข้าวโพดหวานในระบบเกษตรอินทรีย์ (ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี) ใน จ.สตูล มุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ตัวอย่าง ด้านการสารวิเคราะห์ ทดสอบเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวโพดหวานในพื้นที่ดังกล่าว เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้

และเพื่อให้มีการปลูกข้าวโพดหวานและมีปริมาณผลผลิตที่เพียงพอ กับความต้องการของผู้บริโภคและการส่งออกทั้งยัง เป็นการเพิ่มหรือขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน และส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานให้เป็นพืชเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร และการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุจากการไถกลบดันข้าวโพดหวานหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ ผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีหรือทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อให้พื้นที่ปลูก สามารถทำการเกษตรแบบยั่งยืนได้ การศึกษาวิจัยวิธีการ การผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ที่สุด แล้วนำความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปแนะนำส่งเสริมให้กับเกษตรกรทั่วไปได้รับความรู้เมื่อพื้นที่ปลูกข้าวเพิ่มขึ้น ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น เกษตรกรผู้ทำนา ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน ก่อนและหลังการทดลอง
2. เพื่อศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการผลิตข้าวโพดหวานในระบบเกษตรอินทรีย์
3. เพื่อศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าวโพดหวานใน试验ทดลอง

การตรวจเอกสาร

ราตุอาหารมีอิทธิพลต่อพืชทั้งด้านผลผลิตและคุณภาพ พืชต้องการปริมาณและชนิดของราตุอาหารในแต่ละ ช่วงของการเจริญเติบโตไม่เท่ากัน โดยต้องการในปริมาณที่เพิ่มขึ้นตามส่วนของการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น เมื่อพืช เจริญเติบโตถึงช่วงหนึ่งพืชจะต้องการปริมาณราตุอาหารคงที่ ไม่เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีการใส่ลงใบอีกพืชก็ไม่สามารถดูดมา ใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากพืชเจริญเติบโตเต็มที่แล้วและได้ดูดกินอาหารมาสะสมไว้มากพอแล้วทำให้เกิดการสูญเสียและ ตกค้างอยู่ในดิน และหากมีปริมาณที่มากเกินไปจะก่อให้เกิดเป็นพิษได้ทำให้พืชมีลักษณะการตอบสนองผิดไปจากเดิม เกิดการชะักการเจริญเติบโตของพืช ระบบการทำงานของพืชผิดปกติ (อภิรดี, 2535)

แนวทางการการเพิ่มอินทรีย์วัตถุ

อินทรีย์วัตถุมีคุณสมบัติที่ฟิ้งประสงค์ทางการเกษตร การเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุแก่ดินจะช่วยปรับปรุงบำรุง ดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช วิธีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุโดยทั่วไปโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด

C/N ratio เป็นปัจจัยที่บ่งชี้ว่าในการย่อยสลายสารอินทรีย์นั้นจะมีแนวโนրเจนเพียงพอ กับความต้องการของ จุลินทรีย์และทำให้การย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ยงยุทธและคณะ, 2541) ควรบ่อนใน องค์ประกอบของวัสดุอินทรีย์เป็นแหล่งพลังงานให้กับจุลินทรีย์ ส่วนในตอรเจนจะเป็นแหล่งให้เปรตินในการสร้าง เนื้อเยื่อของจุลินทรีย์ C/N ratio มีอิทธิพลต่อการเสื่อมสลายของอินทรีย์วัตถุมากเป็นอันดับหนึ่ง (ปัทมา, 2524) ค่า C/N ratio สามารถนำมาใช้ประเมินความยากง่ายในการย่อยสลายของวัสดุอินทรีย์ต่างๆ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี ค่า C/N ratio แคบกว่า 100 : 1 จัดเป็นวัสดุย่อยสลายได้ง่ายและ กลุ่มที่มีค่า C/N ratio กว้างกว่า 100 : 1 จัดเป็น วัสดุประเภทย่อยสลายยาก (มุกดา, 2545)

คำแนะนำการปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ

1. การใช้ปุ๋ยคอกเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ควรเลือกปุ๋ยคอกเกราๆ ที่ผ่านการย่อยสลายตามธรรมชาติแล้ว ปุ๋ยคอก เก่าที่สภาพแห้งแม่จะมีปัญหาการสูญเสียในตอรเจนไม่มาก แต่ก็ควรไถกลบปุ๋ยคอกหลังใส่ลงดินทันที

2. การวัดอินทรีย์ที่มีค่า C/N ratio แคบในการทำปุ๋ยหมักจะได้ปุ๋ยหมักเร็ว ในขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักหากมี การใช้ปุ๋ยคอก หรือสารเร่งบางชนิดผสมอยู่ด้วยจะช่วยให้ได้ปุ๋ยหมักในระยะเวลาอันรวดเร็วและมีคุณภาพ

3. ปุ๋ยพืชสดที่นิยมใช้เป็นพืชปรับปรุงดินส่วนใหญ่เป็นพืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า เป็นต้น เมื่อ ทำการไถกลบพืชปุ๋ยสดลงดินจะได้ในตอรเจนจากการสลายตัวของพืชและจากกิจกรรมของ虫子เบี่ยงควบคู่กัน

4. การไถกลบตอซังหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินโดยตรง

5 ตอซังที่เกอกลับควรทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเพื่อให้เกิดการย่อยสลายก่อนทำการปลูกพืช เช่น ตอซังข้าวโพดและพืชตระกูลถั่ว ใช้เวลาประมาณ 15 วัน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2549)

อินทรีย์วัตถุมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพ ทางชีวภาพ และทางเคมี มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและการเจริญเติบโตของพืช การทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีการเพิ่มเติมอินทรีย์วัตถุให้กับดินจะเป็นสาเหตุให้ดินเสื่อมโทรมและผลผลิตของดินลดลง วิธีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินได้แก่ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของปุ๋ยกอค ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด และเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีผลผลอยได้จากการร่วมทางการเกษตรที่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุคุณในการเพิ่มพูนอินทรีย์วัตถุให้แก่ได้เป็นอย่างดี (พัชรี, 2549)

ตารางที่ 1 ค่า C/N ratio ของวัสดุอินทรีย์บางชนิด

วัสดุอินทรีย์	ค่า C/N ratio
<u>มูลวัว</u>	<u>13 – 17</u>
มูลควาย	12 – 23
มูลหมู	14 – 16
มูลเป็ด	17 – 29
ชาကพืช	13
ฟางข้าว	80 – 125
<u>ต้นข้าวโพด</u>	<u>60</u>
chan อ้อย	140 – 190
ชี้เลือย	200 – 400
ผักตบชวา	34
เปลือกถั่วถุง	75
ขุยมะพร้าว	167
แกลบ	152
ต้นปอกระเจา	115
เปลือกมันสำปะหลัง	58
<u>ไส้ปอเทือง</u>	<u>52</u>
ต้นหญ้าขัน	35
ต้นถั่วอ่อน	20
ต้นถั่วแก่	40

ที่มา: ชัยทัศน์ (2536) ; คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา (2541) ; วิเชียร (2541) และมุกดา (2545)

คุณสมบัติของกลุ่มชุดดินที่ 26 เป็นดินลึกถึงลึกมาก เนื้อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินทรายปนดินร่วน หรือดินเหนียว มีสีแดงหรือสีแดงเข้ม สีน้ำตาล สีน้ำตาลปนเทา สีน้ำตาลปนเหลือง สีน้ำตาลปนแดง ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนทราย มีสีน้ำตาล สีน้ำตาลปนเหลือง สีน้ำตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง สีแดง สีแดงเข้มหรือสีน้ำตาลปนเทาและมีสีปนสีแดงคล้ายจุดประอยู่ทั่วไป อาจพบชั้นทินเกรนิตผุที่ความลึกระหว่าง 500-100 ซม. มีการระบายน้ำดี การไหล่บ่าของน้ำบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว น้ำซึมผ่านได้ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงกรดรุนแรงมาก (pH 4.5-6.5) มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ

ชุดดินลำภูรา (Lamphu La series : L) จัดอยู่ใน fine, mixed, semiactive, isohypertermic Typic Palehumults เกิดจากการพัดพามาทับถมของวัตถุเคลื่อนย้ายพากหินตะกอนเนื้อละเอียด ส่วนใหญ่เป็นหินดินดานหรือหินตระกูลเดียวกัน บนลานตะพักลำน้ำ สภาพพื้นที่ทิพมีลักษณะค่อนข้างราบรื่นลุกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 14 เปอร์เซ็นต์ ชุดดินนี้เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ำดี คาดว่าดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านปานกลาง มีการไหล่บ่าของน้ำบนผิวดินปานกลาง ตามปกติแล้วระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1 เมตร ตลอดปี

ดินบนลีกประมาณ 20 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วน ปนดินเหนียว หรือดินเหนียว สีฟ้าเป็นสีเข้มมากของสีน้ำตาลปนเทา ถึงสีน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงกรดจัดมาก ($\text{pH } 5.0-5.5$) ส่วนดินล่าง มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีฟ้าเป็นสีน้ำตาลแก่ หรือสีน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดจัดมาก ($\text{pH } 5.0-5.5$)

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ดินและระดับความอุดมสมบูรณ์ของชุดดินลำภูรา

ระดับความเป็นกรดเป็นด่าง	ความจุแลกเปลี่ยนแคนต์ไออกอน (cmol_e/kg)	ความอิ่มตัวของเบส (%)	ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (%)	ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (mg/kg)	โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (mg/kg)	ระดับความอุดมสมบูรณ์
-	16.26	8.60	2.18	2.18	17.40	ต่ำ

(กรมพัฒนาที่ดิน, 2548)

ปัญหาและข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร

- ขาดธาตุอาหารบางธาตุ และความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลางถึงต่ำ
- สภาพพื้นที่ค่อนข้างลาดชัน และเนื้อดินเป็นดินทราย
- ในพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันสูง จะมีการสูญเสียหน้าดินโดยการกร่อน
- ความสามารถในการอุ้มน้ำของดินต่ำ พืชขาดแคลนน้ำในช่วงเพาะปลูก

การจัดการเพื่อให้เหมาะสมในการปลูกพืช

1. เลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และชนิดของพืช เหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและพืชผักต่างๆ หรือพัฒนาเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ แต่ไม่เหมาะสมในการทำนา เนื่องจากอยู่ที่ดอน สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน ดินมีการระบายน้ำดี ระดับน้ำได้ดีน้อยลึก

2. การจัดการเพื่อการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน การทำให้ดินร่วนซุยเหมาะสมต่อการปลูกพืชไร่ และพืชผักมี 3 วิธี 1) ใช้ปุ๋ยเคมี เช่น ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก เป็นต้น ใช้อัตรา 1.5-2 ตันต่อไร่ โดยการหัวน้ำแล้วพรุน กกลบ หรือ 2) ปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทืองหรือโสนอัฟริกันแล้วไถกลบเมื่อออุดอกเป็นพืชปุ่ยสด และ 3) ใส่สวัสดุปรับปรุงดิน เช่น การถวายเหลือง ขี้เลือย แกลบ และเศษพืช เป็นต้น ไถกลบลงไปในดิน

3. การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน

3.1 การปลูกพืชหมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่วสลับอยู่ในระบบการผลิตพืช เช่น ถั่วเหลือง-ข้าวโพด หรือ พืชผัก-ถั่วต่างๆ

3.2 การปลูกพืชปุ่ยสดแล้วไถกลบ

3.3 กรณีที่ความเป็นกรดเป็นด่างของดินต่ำกว่า 5.0 อาจจำเป็นต้องใส่ปูนเพื่อยกระดับพื้นที่เช่นมาไกลั่นกลาง อัตราที่ใช้ประมาณ 100-500 กิโลกรัมต่อไร่

4. การจัดการเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย เช่น 1) การไถพรุน หรือการปลูกพืชตามแนวระดับของความลาดชันของพื้นที่ 2) ทำร่องระบายน้ำ ตลอดจนมีมาตรการชะลอความเร็วของการไหลบ่าบนผิวน้ำ และ 3) ในบริเวณที่มีความลาดชันสูง ควรทำชั้นบันไดและปลูกพืชคลุมดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548)

ข้าวโพดหวาน (Sweet corn) เป็นพืชสมุนไพรที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ *Zea mays L.* Var *Saccharata*. อยู่ในตระกูล *Gramineae* ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับหญ้าหรือข้าว เป็นพืชไร่ อายุสั้น ปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ควรปลูกช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มกราคม หรือต้นฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม จะให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ ระบบ rak ของข้าวโพดมีระบบ rak ฝอย ซึ่งเจริญมาจาก 2 ส่วนคือรากที่เจริญมาจากคัพกะเรียกว่า primary root เป็นรากที่มีการพัฒนามาจากแรดติเคิลและมีรากแขนงแตกออกจากราก เรียกว่า lateral root นอกจากนี้ยังมีรากที่เกิดขึ้นที่ scutellar node เรียกว่า seminal root รากทั้งหมดนี้มีการเจริญเติบโตในระยะเวลาอันสั้นๆ ขณะที่ข้าวโพดเป็นต้นกล้าและจะตายไปเมื่อต้นข้าวโพดโตขึ้น รากส่วนที่สองคือรากที่เจริญจากลำต้นเรียกว่า adventitious root มีจุดกำเนิดรากที่ข้อส่วนล่างของลำต้น ข้อแรกที่เกิดรากชนิดนี้คือ coleoptilar node รากเหล่านี้จะเจริญอยู่ตลอดชีวิตของข้าวโพดซึ่งแผ่กระจายรอบลำต้นแต่ไม่มีรากแก้ว ลำต้นประกอบด้วยข้อและปล้อง

บริเวณข้อมีเนื้อเยื่อเจริญ จุดกำเนิดراك ตาและรอยกาบใบ ในประกอบด้วย กาบใบ และแผ่นใบ กาบใบจะหุ้มลำต้น ส่วนแผ่นใบแผ่กว้างออกมีเส้นกลางใบ ดอกข้าวโพดมีช่อดอกตัวผู้เรียกว่า tassel และช่อดอกตัวเมียเรียกว่า ear อุยบุน ต้นเดียวกันแต่แยกกันอยู่คุณลักษณะต่างๆโดยช่อดอกตัวผู้อยู่ที่ส่วนยอดของลำต้นส่วนซ่อดอกตัวเมียหรือฝักเกิดจากต้นที่ มุมใบข้อที่งับจากใบลงมา ผลและเมล็ดเป็นแบบ caryopsis ที่มีเยื่อหุ้มผลติดอยู่กับเปลือกหุ้มเมล็ดมีลักษณะเป็นเยื่อบางๆไม่มีเมล็ด เยื่อหุ้มผลและเยื่อหุ้มเมล็ดรวมเรียกว่า hull ข้าวโพดจะสะสมแป้งไว้ในส่วนของเอนโดสเปริม การสะสมแป้งจะสัดสูตรลงเมื่อข้าวโพดเติบโตถึงระยะสุดแก่ทางสรีรวิทยา โดยจะปรากฏแผ่นเยื่อสิน้ำตาล หรือน้ำตาลทำให้ บริเวณโคนของเมล็ด (ชูศักดิ์, 2546) พื้นที่ที่เหมาะสมต้องการปลูกข้าวโพดหวาน ควรเป็นพื้นที่ราบสม่ำเสมอ มีความลาดเอียงไม่เกิน 5% ไม่มีน้ำท่วมชั่ว หากเป็นพื้นที่น้ำท่วมชั่วทำการขุดคุยก่อนเพื่อการระบายน้ำ ดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีอินทรีย์วัตถุไม่น้อยกว่า 1.5% ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มากกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ไม่น้อยกว่า 40 ส่วนในล้านส่วน มีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดี หน้าดินลึก 25-30 ซม. มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 5.5-6.8 อุณหภูมิที่เหมาะสม ประมาณ 24-35°C ปริมาณน้ำฝนประจำสมำเสมอ ประมาณ 1,000-1,200 มม./ปี (สถาบันพืชไร่, 2547) พื้นที่ปลูกข้าวโพดหวานส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันตก มีพื้นที่ปลูกประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ จังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม เป็นต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกประมาณร้อยละ 23 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศแหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่ นครราชสีมา ยโสธร นครพนม บุรีรัมย์ ขอนแก่น หนองคาย อุดรธานี เป็นต้น ภาคเหนือมีพื้นที่ปลูกร้อยละ 21 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศแหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย เป็นต้น ภาคกลางมีพื้นที่ปลูกร้อยละ 14 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศแหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่ ปทุมธานี สาระบุรี ลพบุรี และอยุธยา ภาคใต้มีพื้นที่ปลูกร้อยละ 10 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศแหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่ สุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช ยะลา นราธิวาส พังงา และปัตตานี และภาคตะวันออก มีพื้นที่ปลูกร้อยละ 2 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศแหล่งที่สำคัญได้แก่ จันทบุรี สาระแก้ว ชลบุรี และระยอง (กรมวิชาการเกษตร, 2547)

ตารางที่ 3 การใส่ปุ๋ยข้าวโพดหวานตามอัตราของค่าวิเคราะห์ดิน

ค่าวิเคราะห์ดิน	อัตราปุ๋ยที่ใส่ (กิโลกรัมต่่อไร่)
ข้าวโพดหวาน	
OM.%	1 < 1-2 > 2
P (มก./กก.)	10 < 10-15 > 15
K (มก./กก.)	60 < 60-100 > 100

(กรมวิชาการเกษตร, 2548)

ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่มีองค์ประกอบของอินทรีย์สารตามธรรมชาติที่ได้จากการพอกพืช ชาดสัตว์ สิ่งขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตและพวกลินทรีย์สารที่เป็นของเหลวทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์มีคุณสมบัติในการปรับปรุงสมบัติของดิน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศดีขึ้น ช่วยอุ้มน้ำดีขึ้น ปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้เป็นกลาง ลดความเป็นพิษของโลหะหนัก ช่วยเก็บและปลดปล่อยธาตุอาหารให้เป็นประโยชน์กับพืช ลดอัตราการชะล้างพังทลายของดิน ส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน เป็นตัวเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้กับดินและเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีให้เป็นประโยชน์ต่อพืชมากขึ้น (กรมวิชาการเกษตร, 2551)

ปุ๋ยชีวภาพ เป็นวัสดุหรือสารที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเป็นตัวดำเนินกิจกรรม ให้รاثาทุอาหารแก่พืช หรือทำให้รاثาทุอาหารที่อยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เปลี่ยนเป็นรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้เพิ่มขึ้น เช่น โรเชเบี้ยมสร้างปุ๋ยในตอรเจนให้แก่พืชตระกูลถั่ว จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตช่วยทำให้หินฟอสเฟตหรือฟอสเฟตที่ถูกยึดตึงอยู่ในดินให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้เพิ่มขึ้น (กรมวิชาการเกษตร, 2551) หรือเป็นปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่มีคุณสมบัติพิเศษ สร้างรاثาทุอาหารพืชได้เองหรือสามารถเปลี่ยนรاثาทุอาหารที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้มาอยู่ในรูปที่พืชสามารถใช้ประโยชน์ได้ (ทศนิย์และคณะ, 2550)

หรือการนำจุลินทรีย์มาใช้ในการปรับปรุงดินทางชีวภาพ ทางชีวเคมีและการย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุ พืช จากอินทรีย์หรือจากอนินทรีย์วัตถุ (มุกดา, 2545)

ปุ๋ยหมัก พด.1 หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการนำชาจากพืชหรือเศษเหลือจากพืช เช่น ทะลายปาล์ม, ขี้เลื่อย, เปเลือกถั่ว เป็นต้น มาหมักรวมกันและผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ *Actenomycese* ย่อยสลายสารประกอบเซลลูโลสและจุลินทรีย์ประเภท *Bacteria* ย่อยสลายสารประกอบไขมันทำให้ได้ปุ๋ยหมักที่มีคุณสมบัติปรับปรุงดินให้ร่วนซุย มีการระบายน้ำออกอากาศและการอุ่มน้ำดีขึ้นเพิ่มรากต่ออาหารหลักต่ออาหารรอง ดูดซึดธาตุอาหารไม่ให้ถูกชะล้างและเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ดิน(กรมพัฒนาที่ดิน, 2551) จากการทดลองของวรรณลด้าและคณะ(2532) ในชุดดินปากช่องพบว่า การใส่ปุ๋ยหมักตั้งแต่ อัตรา 4 ตัน/ไร่ มีผลทำให้ปริมาณธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณฟอสฟอรัสในดินและทำให้ระดับความชื้นและความเป็นกรดเป็นต่างของดินสูงขึ้น (จริญและคณะ, 2540)

การผลิตปุ๋ยหมัก พด.1 มีส่วนผสมของวัสดุในการกองปุ๋ยหมัก 1 ตัน คือ

1.เศษพืชแห้ง	1,000 กิโลกรัม
2.มูลสัตว์	200 กิโลกรัม
3.ปุ๋ยในโตรเจน	2 กิโลกรัม หรือน้ำหมักชีวภาพจากปลา 10 ลิตร
4.สารเร่ง พด.1	1 ซอง

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เป็นปุ๋ยที่ได้จากการนำจุลินทรีย์ที่มีชีวิตสร้างอาหาร ธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชมาใช้ปรับปรุงดินทางชีวภาพ ทางชีวภาพและทางชีวเคมี ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นและสร้างอิทธิพลส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วย จุลินทรีย์ที่ให้รากในโตรเจน จุลินทรีย์ที่ให้รากฟอสฟอรัส จุลินทรีย์ที่ให้รากโพแทสเซียมและจุลินทรีย์ที่ผลิตอิทธิพลและสารเสริมการเจริญเติบโต

จุลินทรีย์ที่ให้รากในโตรเจนมี 2 กลุ่มคือจุลินทรีย์ที่อยู่ร่วมกับพืชได้แก่ *Rhizobium* เป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงสามารถทดสอบแทนไนโตรเจนจากปุ๋ยเคมีได้โดยให้กับพืชอาศัยมากกว่า 50 เปลอร์เซ็นต์ (กรมวิชาการเกษตร, 2548) และจุลินทรีย์ที่อยู่อย่างอิสระได้แก่ *Azotobacter sp.*, *Azospirillum sp.* และ *Bacillus sp.* เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศและเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแอมโมเนียนที่เป็นประโยชน์ต่อพืชโดยกิจกรรมเอนไซม์ในโตรเจนส์ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551)

จุลินทรีย์ที่ให้รากฟอสฟอรัสมี 2 กลุ่มคือจุลินทรีย์ที่ช่วยดูดซับรากฟอสฟอรัสให้กับพืชได้แก่ 'ไมโครไรซ่าซิ่ง' เป็นจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในรากพืชแบบพึ่งพาซึ่งกันและกันมี 2 ชนิดคือ วี-เอไมโครไรซ่าและเอคโคไมโครไรซ่าเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวน้ำและชอนไซเด็กซ์เข้าไปในดินได้สัมผัสกับรากฟอสฟอรัสและจะดูดรากนูน์โดยตรงแล้วถ่ายทอดต่อไปยังรากพืชซึ่งจะช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้อย่างน้อย 25 เปลอร์เซ็นต์ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551) นอกจากนี้ชีวาระโนโโคไรซ่ายังป้องกันไม่ให้รากฟอสฟอรัสที่ละลายออกมานูกตติงโดยปฏิกิริยาทางเคมีของดินด้วยเพราเจี้ยวran น้ำจะช่วยดูดซับเก็บไว้ในโครงสร้างพิเศษที่เรียกว่า อาบสกูลและเวสิเคิลที่อยู่ในเซลล์พืช (มุกดา, 2545) จุลินทรีย์ที่ละลายสารประกอบฟอสเฟต โดยทั่วไปประเทศไทยมีปริมาณฟอสเฟตที่ละลายออกมาน้อยกว่าดินที่อยู่ในชั้น表层 จุลินทรีย์กลุ่มนี้สามารถเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสจากหินฟอสเฟตให้เป็นประโยชน์ได้เช่น *Bacillus sp.*, *pseudomonas sp.*, *Aspergillus sp.* เป็นต้น (กรมวิชาการเกษตร, 2548) และการที่จะให้หินฟอสเฟตละลายได้ดีจะต้องทำให้เกิดสภาพกรดซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้จะผลิตกรดออกมานำลงฟอสฟอรัสให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ (มุกดา, 2545)

จุลินทรีย์ที่ให้รากโพแทสเซียมเป็นจุลินทรีย์ที่ปลดปล่อยกรดอินทรีย์ เช่นกรดแลคติก, กรดซิตริก, กรดออกซิลิก เป็นต้นหรือกรดอินทรีย์ เช่นกรดคาร์บอนิก, กรดไนตริกและกรดซัลฟูริก เป็นต้น ช่วยละลายแร่และวัตถุตันกำเนิดดินที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบ จุลินทรีย์ที่สามารถปลดปล่อยกรดออกมานำลงฟอสฟอรัสให้เป็นประโยชน์ได้ เช่น *Bacillus sp.*, *Pseudomonas sp.*, *Aspergillus sp.* และ *Penicillium sp.* โดยจะละลายได้จากแร่ในกลุ่มไม่ก้าและกลุ่มเฟล์ดสปาร์ไฮอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551) หรือการที่จะทำให้โพแทสเซียมอยู่ในลักษณะที่นำไปใช้ได้มี 3 วิธีคือการสลายทางกายภาพ ทางเคมีและทางอินทรีย์ ซึ่งทำได้โดยการใช้จุลินทรีย์พวกแบคทีเรียเข้า

ช่วยย่อยสลายจะทำให้พืชสามารถนำโพแทสเซียมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้พืชรับพืชสวนและไม้ผลมีคุณภาพผลผลิตที่ดีขึ้น (มุกดา, 2545)

จุลินทรีย์ที่ให้รากอ่อนๆ เช่น รากอาหารรองและรากอาหารเสริมได้แก่ เหล็ก, สังกะสี ซึ่งจะมีอยู่ในดินในสภาพที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ การใช้จุลินทรีย์เข้าช่วยย่อยสลายสามารถทำให้ได้รากอาหารที่มีในดินเหล่านี้มาเป็นประโยชน์แก่พืชได้เพิ่มขึ้น จุลินทรีย์พวก Silicate bacteria สามารถช่วยให้พืชนำชิลิกेटไปใช้ได้ แร่ธาตุที่มีอยู่ในดินจะสามารถถูกทำลายโดยกรดที่เกิดจากการหมักของจุลินทรีย์ได้ (มุกดา, 2545)

จุลินทรีย์ที่สร้างสารกระตุนการเจริญเติบโตหรืออร์โมนพืชคือจุลินทรีย์ Azotobacter sp., Azospirillum sp. และ Bacillus sp. ออร์โมนที่สร้างได้แก่ ออกซิน, จีบเบอเรลลินและไซโตโคนิน ช่วยกระตุนการเจริญของรากชนอ่อนและช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวหากำทำให้ความสามารถในการดูดน้ำรากอาหารเพิ่มมากขึ้น

วัสดุขยายเชื้อปุ๋ยชีวภาพ พด.12 (วัสดุสำหรับการขยายเชื้อ)

1 ปุ๋ยหมัก	300 กิโลกรัม
2 รำข้าว	3 กิโลกรัม
3 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12	100 กรัม (1 ซอง)

วิธีการขยายเชื้อ

1 ผสมปุ๋ยชีวภาพ พด.12 และรำข้าวน้ำ 1 ปีบ (20 ลิตร) คนให้เข้ากันนาน 5 นาที

2 บรรจุในถุงกันน้ำ 2 ถุง กองปุ๋ยหมักและคลุกเคล้าให้เข้ากันปรับความชื้นให้ได้ 70%

3 ตั้งกองปุ๋ยหมักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้มีความสูง 50 ซม. และใช้วัสดุคลุมกองปุ๋ยเพื่อรักษาความชื้น

4 กองปุ๋ยหมักไว้ในที่ร่มเป็นระยะเวลา 4 วัน แล้วจึงนำไปใช้

การใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 มีประโยชน์ในการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 25-30 % เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียมในดิน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย ช่วยสร้างสมดุลของรากอาหารพืช ช่วยเพิ่มผลผลิตพืชและลดต้นทุนการผลิต (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551)

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรในตอร์เจน เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการหมักวัสดุอินทรีย์และอนินทรีย์ธรรมชาติ ทางการเกษตรมีปริมาณรากอาหารหลักของพืชสูง ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์จนสมบูรณ์ และแพร่สภาพรากอาหารให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชและมีประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น เป็นแหล่งรากอาหารรองและจุลธาตุ, มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อตินและพืช, มีการปลดปล่อยรากแก่พืชอย่างช้าๆ ทำให้ลดการสูญเสียรากอาหาร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจะช่วยให้การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ได้ตรงความต้องการของพืชในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตซึ่งจะทำให้ประหยัดการใช้ปุ๋ย ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551)

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรในตอร์เจน

- ปริมาณในตอร์เจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเท่ากับ 4.0-5.0, 3.0-4.0 และ 1.0-2.0 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

ส่วนผสมที่ใช้ในการผลิต ปริมาณ 100 กิโลกรัม

1. กากเมล็ดถั่วเหลืองหรือปลาป่น	60 กิโลกรัม
2. มูลสัตว์	40 กิโลกรัม
3. สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 จำนวน	1 ซอง
4. สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวนที่ขยายเชื้อในภาชนะ 25-30 ลิตร	

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรในตอร์เจน

1. ผสมการเมล็ดถั่วเหลืองหรือปลาป่นและมูลสัตว์ ตามส่วนผสมให้เข้ากัน
2. นำสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 จำนวน 1 ซองเทลงในสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ที่ขยายเชื้อแล้วจำนวน 25-30 ลิตร คนประมาณ 5-10 นาทีนำไปรดนกองวัสดุที่ผสมในข้อ 1 คลุกเคล้าให้ถ่วงกองเพื่อให้ความชื้นสม่ำเสมอทั่วทั้งกอง

3. ตั้งกองปุ๋ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้มีความสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรแล้วใช้วัสดุคลุมกองให้มีดีซิดเพื่อรักษาความชื้นในกองปุ๋ยระหว่างการหมัก

4. กลับกองปุ๋ยทุก 5 วัน และควบคุมความชื้นในระหว่างการหมัก 50-60 เปอร์เซ็นต์

5. หมักกองปุ๋ยเป็นเวลา 10-15 วันหรือจนกระทั่งอุณหภูมิในกองปุ๋ยลดลงเท่ากับภายนอกกองปุ๋ยจึงนำไปใช้ได้

วิธีการขยายเชื้อ พด.2

1. เจือจากน้ำตาลต่อน้ำอัตราส่วน กากน้ำตาล 5 กิโลกรัมต่อน้ำ 50 ลิตร
2. ใส่สารซูปเบอร์พด.2 จำนวน 1 ช่องคนให้เข้ากัน
3. ปิดฝาตั้งไว้ในร่มโดยขยายเชื้อเป็นเวลา 3 วัน

น้ำหมักชีวภาพ พด.2 หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลวซึ่งได้จากการนำรังสิตุเหลือจากพืชหรือสัตว์ซึ่งมีลักษณะสดหรือมีความชื้นสูงในลักษณะเป็นของเหลวและอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ทั้งในสภาพที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน ทำให้ได้ออร์โมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช เช่น Auxin,Gibberellin Cytokinin รวมทั้งกรดอินทรีย์ เช่น กรดแลคติก,กรดอะซิติก,กรดอะมิโนและกรดไขมิก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างเห็นผลและมีประสิทธิภาพทำให้เร่งการเจริญเติบโตของรากพืชเร่งการขยายตัวของใบและยืดตัวของลำต้น ส่งเสริมการออกดอกและติดผลดี ต้านทานโรคและแมลง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551)

การผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด. 2 โดยมีวัสดุที่ใช้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ คือ
น้ำหมักชีวภาพจากปลา จำนวน 50 ลิตร (ใช้เวลาในการหมัก 15-20 วัน)

1.ปลา	30 กิโลกรัม
2.ผลไม้ (สับปะรด)	10 กิโลกรัม
3.กากน้ำตาล	10 กิโลกรัม
4.น้ำ	10 ลิตร (หรือให้ท่วมวัสดุหมัก)
5.สารเร่ง พด.2	1 ช่อง (25 กรัม)

จากการศึกษาพบว่า ปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองในน้ำหมักชีวภาพจากปลา มีปริมาณในต่อเจน พอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมgnีเซียม และกำมะถันโดยเฉลี่ย 0.98, 1.12, 1.03, 1.66, 0.24 และ 0.20 ตามลำดับ ปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองในน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอร์มีปริมาณในต่อเจน พอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมgnีเซียม และกำมะถันโดยเฉลี่ย 0.73, 0.24, 0.89, 2.90, 0.32 และ 0.22 ตามลำดับ ปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองในน้ำหมักชีวภาพจากผักและผลไม้มีปริมาณในต่อเจน พอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมgnีเซียม และกำมะถันโดยเฉลี่ย 0.14, 0.04, 0.53, 0.08, 0.06 และ 0.11 ตามลำดับและปริมาณออร์โมนออกซิน จิบเบอเรลลิน ไซโตคินินและกรดไขมิกในน้ำหมักชีวภาพจากปลาโดยเฉลี่ย 4.01, 33.07, 3.05 มก.ต./ลิตร และ 3.36% ตามลำดับ ปริมาณออร์โมนออกซิน จิบเบอเรลลิน ไซโตคินินและกรดไขมิกในน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอร์โดยเฉลี่ย 6.85, 37.14, 13.62 มก.ต./ลิตร และ 3.07% ตามลำดับ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551)

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ	เริ่มต้น	เดือนตุลาคม	พ.ศ. 2561
	สิ้นสุด	เดือนกันยายน	พ.ศ. 2563

สถานที่ดำเนินการ

1. สถานที่ตั้ง

แปลงเกษตรกรพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหารา ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
พิกัด 619037 E 763595 N

2. สภาพพื้นที่

พื้นที่แปลงทดลองเป็นชุดดินลักษณะ อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 26 เป็นดินลึกถึงลึกมาก เนื้อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินทรายปนดินร่วน หรือดินเหนียว มีสีแดงหรือสีแดงเข้ม สีน้ำตาล สีน้ำตาลปนเทา สีน้ำตาลปนเหลือง สีน้ำตาลปนแดง ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนเหนียว

ปั่นทราย ดินเหนียวปันทราย มีสีน้ำตาล สีน้ำตาลปนเหลือง สีน้ำตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง สีแดง สีแดงเข้ม หรือสีน้ำตาลปนเทา และสีปนแดงคล้ายจุดประอยู่ทั่วไป อาจพบชั้นหินแกรนิตผุที่ความลึกระหว่าง 50-100 ซม. มีการระบายน้ำดี การไหล่ป่าของน้ำบนผิวน้ำดินปานกลางถึงเร็ว น้ำซึมผ่านได้ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงกรดรุนแรงมาก (4.5-6.5) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ

อุปกรณ์และวิธีการ

1. อุปกรณ์

1. วัสดุที่ใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ได้แก่ กากถั่วเหลือง มูลวัว สารเร่งชุปเปอร์ พด. 1 และ สารเร่งชุปเปอร์ พด. 2
2. วัสดุที่ใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก พด.1 รำลະເອີຍດ สารเร่งชุปเปอร์ พด. 12
3. วัสดุในการผลิตปุ๋ยหมัก พด.1 ได้แก่ กากปาล์มน้ำมัน มูลไก่ และสารเร่งชุปเปอร์ พด. 1
4. วัสดุในการทำน้ำหมักชีวภาพ พด.2 ได้แก่ ปลาเป็ด สับปะรด กากน้ำตาล และ สารเร่งชุปเปอร์ พด. 2
5. ตลับเมตร ไม้หลักสำหรับแบ่งแปลงย่อย และป้ายแปลง
6. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างต่อวัน
7. อุปกรณ์สำหรับเก็บผลผลิต เช่น ถุงใส่น้ำยาาง ถุงตาข่ายใส่ตัวอย่างผลผลิต
8. เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมีในห้องปฏิบัติการ เช่น เครื่องซั่ง ตู้อบ ถ้วยอบตัวอย่าง กรดอะซิติก

2. วิธีการ

2.1 วางแผนการทดลองแบบ : วางแผนการทดลอง RCBD (Randomized Complete Block Design) โดยมี 9 ตัวรับการทดลอง 3 ชั้น ดังนี้

ตัวรับที่ 1 = ปุ๋ยหมัก พด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ + สับกลบตอซังข้าวโพดหวาน

ตัวรับที่ 2 = ปุ๋ยหมัก พด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ + น้ำหมักชีวภาพ

ตัวรับที่ 3 = ปุ๋ยหมัก พด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ + พืชปุ๋ยสด + น้ำหมักชีวภาพ

ตัวรับที่ 4 = ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ + สับกลบตอซังข้าวโพดหวาน

ตัวรับที่ 5 = ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ + น้ำหมักชีวภาพ

ตัวรับที่ 6 = ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ + พืชปุ๋ยสด + น้ำหมักชีวภาพ

ตัวรับที่ 7 = ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ + สับกลบตอซังข้าวโพดหวาน


ตัวรับที่ 8 = ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ + น้ำหมักชีวภาพ

ตัวรับที่ 9 = ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ + พืชปุ๋ยสด + น้ำหมักชีวภาพ

หมายเหตุ

- 1) คำนวณโดยใช้ค่าปริมาณอินทรีย์ต่ำของชุดดินลำภูรา เท่ากับ 2.18 เปอร์เซ็นต์ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548)
- 2) เปอร์เซ็นต์อินทรีย์ต่ำและเปอร์เซ็นต์ความชื้นของปุ๋ยหมัก พด.1 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ที่ใช้ในการคำนวณได้จากการวิเคราะห์ของโรงปุ๋ยในพื้นที่ โดยปุ๋ยหมัก พด.1 มีค่า OM 21.92 % ที่ความชื้น 25% ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 มีค่า OM 26.86% ที่ความชื้น 25% และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมีค่า OM 24.66% ที่ความชื้น 25%
- 3) ในความเป็นจริง ปริมาณปุ๋ยที่ใช้อาจปรับเปลี่ยนไปตามผลวิเคราะห์ดินปัจจุบันของพื้นที่ที่ทำการทดลองและผลวิเคราะห์ปุ๋ยที่ใช้ในการทดลอง เพื่อให้การยกระดับอินทรีย์ต่ำเป็นไปตามที่กำหนด
- 4) ใส่น้ำหมักชีวภาพ พด.2 ในตัวรับการทดลองที่ 2, 3, 5, 6, 8 และ 9
- 5) มีการปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) และไถกลบเมื่อครบอายุ 55 – 60 วัน (ออกoko 50 เปอร์เซ็นต์) ในตัวรับการทดลอง ที่ 3, 6 และ 9
- 6) หลังจากทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตทำการสับกลบตอซังข้าวโพดหวานในตัวรับการทดลองที่ 1, 4 และ 7

แผนผังแปลงทดลอง



2.2 การเตรียมแปลง

1. สำรวจและคัดเลือกพื้นที่แปลงทดลองในพื้นที่เกษตรที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล เลือกพื้นที่แปลงที่เป็นกลุ่มชุดดินที่ 26 ชุดดินลำภูรา
2. เตรียมแปลงทดลองและสุ่มตัวรับการทดลองในพื้นที่ทดลองใช้พื้นที่ขนาด 4×4 เมตรเก็บข้อมูล 3×3 เมตร (มี 9 ตัวรับการทดลอง 3 ชั้น) รวมเป็น 27 แปลงอยอยใช้พื้นที่การทดลองทั้งหมดประมาณ 800 ตารางเมตร
3. เก็บตัวอย่างดินก่อนและหลังการทดลองที่ระดับ 0 - 15 เซนติเมตรเพื่อวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินดังนี้ปริมาณ pH OM Total.N P K Ca และ Mg
4. ทำ Site characterization

2.3 การเตรียมดิน

1. ไถด้ 1 ครั้ง ให้ลึกประมาณ 15-30 ซม. และตากดินไว้ประมาณ 7 วันเพื่อทำลายโรคและแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน

2. ไอล์ฟ 1-2 ครั้ง เพื่อให้ดินร่วนซุย เหมาะแก่การทำร่องหรือแ胄ปคูลและการออกของเมล็ดข้าวโพดหวาน

2.4 การปลูก

1. หยอดเมล็ดข้าวโพดหวานหลุมละ 2-3 เมล็ด (คลุกยาป้องกันเชื้อรา) ใช้เมล็ดข้าวโพดหวานประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม/ไร่
2. เมื่อข้าวโพดหวานอายุ 14 วัน ถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งให้เหลือไว้ 1 ต้นต่อหลุม
3. เมื่อข้าวโพดหวานมีอายุ 25-30 วัน ควรใส่น้ำหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเรียบ
5. กำจัดวัชพืชบริเวณรอบโคนต้นทำพร้อมกับการใส่ปุ๋ย เพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชแย่งปุ๋ยข้าวโพดหวาน

2.5 การใส่ปุ๋ย

- ใส่ปุ๋ยหมัก พด.1 อัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อข้าวโพดหวานอายุ 20 วัน และอายุ 40 วัน ในทำรับที่ 1-3
 - น้ำหมักชีวภาพ พด.2 อัตรา 200 ซีซี/ผืนน้ำ 100 ลิตรต่อไร่ ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุกๆ 7 วัน ในทำรับที่ 2,3,5,6,8 และ ทำรับที่ 9
 - ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อข้าวโพดหวานอายุ 20 วัน และอายุ 40 วัน ในทำรับที่ 4-6
 - ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อข้าวโพดหวานอายุ 20 วัน และอายุ 40 วัน ในทำรับที่ 7-9

2.6 การป้องกันโรค

- ปุ๋ยหมัก พด.3 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ป้องกันโรครากรเน่าโคนเน่าในทุกทำรับการทดลอง

2.7 การป้องกันแมลง

- สารควบคุมแมลงศัตรูพืช พด.7 ที่เจือจางแล้วอัตรา 50 ลิตรต่อไร่โดยฉีดพ่นที่ใบ ลำต้น และรดลงดินทุกๆ 20 วัน หรือซึ่งที่แมลงระบาดพ่นทุกๆ 3 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง ในทุกทำรับการทดลอง
- หมายเหตุ:** การเจือจางสารควบคุมแมลงศัตรูพืชต่อน้ำ เท่ากับ 1 ลิตรผืนน้ำ 100 ลิตร

2.8 การเก็บเกี่ยว

- หลังจากข้าวโพดหวานออกใหม่ 50 เปอร์เซนต์ของทั้งแปลงให้นับอีก 18-20 วัน จึงเก็บผลผลิตหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดหวานเมื่ออายุ 65-75 วัน

2.9 การเก็บรวบรวมข้อมูล

- พื้นที่เก็บเกี่ยวข้อมูล ขนาด 3 x 3 เมตร ต่อทำรับการทดลอง
- เก็บตัวอย่างดินก่อนและหลังการทดลองในระดับความลึก 0-15 ซม. ทุกทำรับการทดลองเพื่อวิเคราะห์สมบัติของดินก่อนและหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดหวาน
 - บันทึกข้อมูลผลวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน ดังนี้ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ปริมาณอินทรีย์วัตถุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม
 - บันทึกข้อมูลน้ำหนักสดของพืชปุ๋ยสดเมื่ออายุครบกำหนดໄอกกลบ
 - บันทึกข้อมูลผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว (น้ำหนักสดของฝักข้าวโพด)
 - บันทึกข้อมูลน้ำหนักสดของตอบข้าวโพดหวานหลังการเก็บเกี่ยวก่อนทำการสับกลบ
 - ทำการทดลองปลูกข้าวโพดหวานช้าอีก 1 ฤดูกาล (ไม่รวมฤดูกาลที่ทำการทดลอง) เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของดินหลังจากใส่ปัจจัยต่างๆ ไปแล้ว

ผลการวิจัยและวิจารณ์

การศึกษาการจัดการอินทรีย์ตุ่นในดินเพื่อการผลิตข้าวโพดหวานในระบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสตูล ดำเนินการทดลองในช่วง เดือนตุลาคม 2561 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2563 ที่แปลงเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้าน น้ำหารา ตำบลลุ่มน้ำย อำเภอความกาหลง จังหวัดสตูล พบร่วม

1. การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินก่อนการทดลอง

1.1 ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH)

จากผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินก่อนดำเนินการทดลองในปีที่ 1 (ตารางที่ 1) พบร่วม ก่อนการทดลอง ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 3.77 - 6.47 อยู่ในระดับกรดรุนแรงถึงระดับเป็นกรดเล็กน้อย หลังการทดลองค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ พบร่วมดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเพิ่มขึ้นในทุกตัวรับการทดลอง มีค่าอยู่ระหว่าง 4.67 - 5.60 ซึ่งตัวรับการทดลองที่ 3 การใส่ปุ๋ยหมัก พด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพและตัวรับการทดลองที่ 8 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างสูงที่สุด คือ 5.60 อยู่ในระดับกรดจัดเล็กน้อย ส่วนตัวรับการทดลองที่ 9 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสดและน้ำหมักชีวภาพ ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างต่ำที่สุด คือ 4.67 อยู่ในระดับกรดจัด สำหรับการทดลองปีที่ 2 (ตาราง 1) พบร่วม ก่อนการทดลองดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 5.27 – 5.83 ซึ่งอยู่ในระดับกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย หลังจากการทดลองพบว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ตัวรับการทดลองที่ 2 การใส่ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างสูงที่สุดเท่ากับ 5.57 อยู่ในระดับกรดจัด ตัวรับการทดลองที่ 9 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสดและน้ำหมักชีวภาพ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินต่ำที่สุด

ตารางที่ 4 ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินก่อนและหลังการทดลองปีที่ 1 และปีที่ 2

ตัวรับการทดลอง	ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH 1:1)			
	ปีที่ 1		ปีที่ 2	
	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง
ตัวรับที่ 1 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	5.40	5.17	5.27	5.43
ตัวรับที่ 2 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	5.23	5.30	5.60	5.57
ตัวรับที่ 3 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	4.37	5.60	5.53	5.23
ตัวรับที่ 4 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	3.77	5.47	5.57	5.23
ตัวรับที่ 5 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	6.47	5.23	5.77	5.23
ตัวรับที่ 6 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด และน้ำหมักชีวภาพ	4.20	4.80	5.70	5.23
ตัวรับที่ 7 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	4.77	4.97	5.30	5.33
ตัวรับที่ 8 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	5.27	5.60	5.83	5.40
ตัวรับที่ 9 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสดและน้ำหมักชีวภาพ	3.77	4.67	5.50	5.17
F-test	ns	ns	ns	ns
CV (%)	29.49	9.46	6.77	6.24

หมายเหตุ กรณีไม่แตกต่างกันทางสถิติ

1.2 ปริมาณอินทรีย์ตั้งในดิน (OM)

จากการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินก่อนดำเนินการทดลองในปีที่ 1 (ตารางที่ 2) พบว่า ก่อนการทดลองในดินมีปริมาณอินทรีย์ตั้ง (OM) อยู่ในระดับปานกลาง มีปริมาณอินทรีย์ตั้งระหว่าง 1.45 – 2.99 เปอร์เซ็นต์ หลังการทดลองพบว่า ทุกตัวรับการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ตัวรับการทดลองที่ 4 การใส่ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน ในดินมีปริมาณอินทรีย์ตั้งสูงที่สุด เท่ากับ 1.82 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณอินทรีย์ตั้งอยู่ในระดับปานกลาง ตัวรับการทดลองที่ 7 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน ในดินมีปริมาณอินทรีย์ตั้งน้อยที่สุดเท่ากับ 1.57 เปอร์เซ็นต์ ในดินมีปริมาณอินทรีย์ตั้งอยู่ค่อนข้างต่ำ สำหรับการทดลองปีที่ 2 (ตารางที่ 2) พบว่าก่อนการจากทดลองในดินมีปริมาณอินทรีย์ตั้งเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าอยู่ระหว่าง 1.41 – 1.68 เปอร์เซ็นต์ หลังการทดลองพบว่าทุกตัวรับการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ตัวรับการทดลองที่ 1 การใส่ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวานมีปริมาณอินทรีย์ตั้งสูงที่สุดเท่ากับ 1.71 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ตัวรับการทดลองที่ 9 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสดและน้ำหมักชีวภาพ ในดินมีปริมาณอินทรีย์ตั้งสูงที่สุดเท่ากับ 1.37 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการลดลงของปริมาณอินทรีย์ตั้ง เนื่องจากการสูญเสียไปกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได้แก่ อุณหภูมิ และน้ำฝน (ปรัชญาและคณะ, 2534) และปริมาณอินทรีย์ตั้งบางส่วนถูกจุลินทรีย์ใน

ดินนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานด้วย ทำให้ปริมาณอินทรีย์ต่ำในดินลดลง และจากสภาพอากาศที่ร้อนชื้นในภาคใต้ ทำให้ปริมาณอินทรีย์ต่ำมีการสลายตัวเร็ว (วนิดาและศิวพร, 2560)

ตารางที่ 5 ปริมาณอินทรีย์ต่ำในดินก่อนและหลังการทดลองปีที่ 1 และปีที่ 2

ตัวรับการทดลอง	ปริมาณอินทรีย์ต่ำ (%)			
	ปีที่ 1		ปีที่ 2	
	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง
ตัวรับที่ 1 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	1.52	1.81	1.68	1.71
ตัวรับที่ 2 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	2.99	1.62	1.55	1.46
ตัวรับที่ 3 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	2.18	1.67	1.65	1.56
ตัวรับที่ 4 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	1.77	1.82	1.25	1.64
ตัวรับที่ 5 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	2.18	1.64	1.52	1.44
ตัวรับที่ 6 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด และน้ำหมักชีวภาพ	2.92	1.61	1.73	1.56
ตัวรับที่ 7 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	1.45	1.57	1.41	1.47
ตัวรับที่ 8 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	2.00	1.67	1.58	1.58
ตัวรับที่ 9 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสดและน้ำหมักชีวภาพ	2.36	1.66	1.56	1.37
F-test	ns	ns	ns	ns
CV (%)	23.95	14.88	15.41	14.70

หมายเหตุ gr หมายถึง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ

1.3 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน (Avail.P)

จากการวิเคราะห์ที่สมบัติทางเคมีของดินก่อนดำเนินการทดลองในปีที่ 1 (ตารางที่ 3) ดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับสูงมาก อยู่ในช่วง 130.33 – 1,138.33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังการทดลองในปีที่ 1 พบว่าดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ลดลงทุกตัวรับการทดลอง แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ตัวรับการทดลองที่ 8 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงที่สุดเท่ากับ 52.67 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งในดินยังมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับสูง ตัวรับการทดลองที่ 6 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสดและน้ำหมักชีวภาพมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำที่สุดเท่ากับ 8.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สำหรับผลวิเคราะห์ในปีที่ 2 พบว่า ก่อนการทดลองดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าอยู่ระหว่าง 16.00 – 46.67 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังการทดลองพบว่า ทุกตัวรับการทดลองดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ลดลง ทำให้ดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ำ มีค่าอยู่ระหว่าง 6.67 – 16.67 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็นผลเนื่องจากเกิด

กิจกรรมการแปรสภาพฟอสฟอรัสโดยจุลินทรีย์ในดินอย่างสมดุล ซึ่งฟอสฟอรัสจะไม่ถูกดูดยึดโดยสารประกอบแร่ธาตุบางชนิดในดิน (วนิดาและศิวพร, 2560) ในดินทั่วไปมีระดับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำมากเมื่อเทียบกับปริมาณของในโตรเจนและโพแทสเซียม

ตารางที่ 6 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินก่อนและหลังการทดลองปีที่ 1 และปีที่ 2

ตำรับการทดลอง	ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (mg kg^{-1})			
	ปีที่ 1		ปีที่ 2	
	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง
ตำรับที่ 1 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	187.67	16.33	46.67	12.33
ตำรับที่ 2 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	130.33	18.67	20.33	16.67
ตำรับที่ 3 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	238.33	21.00	18.00	15.33
ตำรับที่ 4 ปุ๋ยหมักพด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	1,138.33	41.00	18.67	9.33
ตำรับที่ 5 ปุ๋ยหมักพด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	191.67	19.67	15.67	8.33
ตำรับที่ 6 ปุ๋ยหมักพด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด และน้ำหมักชีวภาพ	124.33	8.00	24.67	12.33
ตำรับที่ 7 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	468.00	12.33	16.00	10.33
ตำรับที่ 8 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	157.67	52.67	21.67	15.00
ตำรับที่ 9 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสดและน้ำหมักชีวภาพ	185.67	10.67	19.33	6.67
F-test	ns	ns	ns	ns
CV (%)	26.7	31.66	30.23	39.7

หมายเหตุ กร หมายถึง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ

1.4 ปริมาณโพแทสเซียมที่ประโยชน์ในดิน (Avail.K)

จากการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินก่อนดำเนินการทดลองในปีที่ 1 (ตารางที่ 4) พบว่าในดินมีปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์เฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมาก คือมีค่าอยู่ระหว่าง 65.50 – 326.33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังการทดลองพบว่าในทุกตำรับการทดลองในดินมีปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ลดลง มีปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง อยู่ในช่วง 37.33 – 86.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สำหรับการทดลองในปีที่ 2 (ตารางที่ 4) ผลวิเคราะห์ดินก่อนการทดลองมีปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าระหว่าง 44.33 – 72.67 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังการทดลองพบว่าทุกตำรับการทดลองในดินมีปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ลดลงเล็กน้อย ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าอยู่ระหว่าง 38.33 – 56.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยผลการใช้วัสดุอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ในการปรับปรุงดินเพื่อปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ของสุวรรณภูมิและคณะ (2559) การที่ปริมาณโพแทสเซียมที่

เป็นประโยชน์ในดินลดลง เนื่องจากโพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ง่าย และสามารถที่จะถูกซึมล้ำงได้ง่ายเช่นกัน โดยเฉพาะในดินเนื้อหยาบในบริเวณที่มีผนังหินซึม ทำให้เกิดการสูญเสียโพแทสเซียมในดินเนื่องจาก การพัดพาไปกับน้ำ (วิเชียร, 2548)

ตารางที่ 7 ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินก่อนและหลังการทดลองปีที่ 1 และปีที่ 2

ตำรับการทดลอง	ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (mg kg^{-1})			
	ปีที่ 1		ปีที่ 2	
	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง
ตำรับที่ 1 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับปะรดตอซังข้าวโพดหวาน	130.33	71.33	57.00	50.67
ตำรับที่ 2 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	82.33	70.67	58.33	45.33
ตำรับที่ 3 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	139.67	63.00	49.67	44.00
ตำรับที่ 4 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับปะรดตอซังข้าวโพดหวาน	65.67	67.33	63.67	40.33
ตำรับที่ 5 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	326.33	56.00	44.33	27.33
ตำรับที่ 6 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด และน้ำหมักชีวภาพ	219.67	53.33	68.67	44.00
ตำรับที่ 7 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับปะรดตอซังข้าวโพดหวาน	113.67	64.67	55.33	44.67
ตำรับที่ 8 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	214.33	86.00	62.67	56.00
ตำรับที่ 9 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสดและน้ำหมักชีวภาพ	173.00	37.33	72.67	38.33
F-test	ns	ns	ns	ns
CV (%)	37.10	25.53	28.23	37.70

หมายเหตุ กร หมายถึง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ

1.5 ปริมาณแคลเซียมในดิน (Ca)

แคลเซียมเป็นธาตุอาหารรองและอยู่ในองค์ประกอบของดิน วัสดุเศษพืชและวัสดุปรับปรุงดินในปริมาณมากกว่าธาตุชนิดอื่น พืชมีความต้องการแคลเซียมมากเช่นกัน เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของรากพืชจากการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินก่อนการทดลองในปีที่ 1 (ตารางที่ 5) พบร่วมกับในดินมีปริมาณแคลเซียมอยู่ในระดับสูง โดยพบว่าก่อนการทดลองในดินมีปริมาณแคลเซียมอยู่ระหว่าง 22.59 – 36.49 เซนติเมตรต่อกิโลกรัม ผลวิเคราะห์ดินหลังการทดลองพบว่า ทุกตำรับการทดลองดินมีปริมาณแคลเซียมลดลง แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ตำรับการทดลองที่ 8 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ มีปริมาณแคลเซียมสูงที่สุดเท่ากับ 2.10 เซนติเมตรต่อกิโลกรัม ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ตำรับการทดลองที่ 6 การใส่ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด และน้ำหมักชีวภาพมีปริมาณแคลเซียมต่ำที่สุดเท่ากับ 0.91 เซนติเมตรต่อ กิโลกรัม ในดินมีปริมาณแคลเซียมอยู่ในระดับต่ำ ปริมาณแคลเซียมในดินก่อนและหลังการทดลองปีที่ 2 (ตารางที่ 5)

พบว่าในдинก่อนการทดลองมีปริมาณแคลเซียมในระดับปานกลาง 1.09 – 2.95 เซนติโมลต่อกรัม (cmol(+)/g) หลังการทดลองพบว่า สำหรับการทดลองที่ 8 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ มีปริมาณแคลเซียมสูงที่สุดเท่ากับ 3.24 เซนติโมลต่อกรัม ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับการทดลองที่ 9 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสดและน้ำหมักชีวภาพ มีปริมาณแคลเซียมในдинต่ำที่สุดเท่ากับ 1.37 เซนติโมลต่อกรัม ซึ่งมีปริมาณแคลเซียมอยู่ในระดับต่ำ

ตารางที่ 8 ปริมาณแคลเซียมที่เป็นประโยชน์ในдинก่อนและหลังการทดลองปีที่ 1 และปีที่ 2

สำหรับการทดลอง	ปริมาณแคลเซียมที่เป็นประโยชน์ ($\text{cmol}(+)/\text{kg}^{-1}$)			
	ปีที่ 1		ปีที่ 2	
	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง
สำหรับที่ 1 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับปะรดตอซังข้าวโพดหวาน	24.24	1.28	1.39	2.15
สำหรับที่ 2 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	34.39	1.26	1.09	2.42
สำหรับที่ 3 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	34.41	1.71	2.14	1.65
สำหรับที่ 4 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับปะรดตอซังข้าวโพดหวาน	22.59	1.97	1.48	1.84
สำหรับที่ 5 ปุ๋ยชีวภาพพด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	24.18	1.37	2.41	1.65
สำหรับที่ 6 ปุ๋ยชีวภาพพด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด และน้ำหมักชีวภาพ	36.49	0.91	2.46	1.80
สำหรับที่ 7 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับปะรดตอซังข้าวโพดหวาน	24.76	1.09	1.72	2.00
สำหรับที่ 8 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	33.95	2.10	2.95	3.24
สำหรับที่ 9 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสดและน้ำหมักชีวภาพ	23.62	0.92	2.21	1.37
F-test	ns	ns	ns	ns
CV (%)	29.52	37.65	31.62	32.55

หมายเหตุ ns หมายถึง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ

1.6 ปริมาณแมgnีเซียมในдин (Mg)

แมgnีเซียมเป็นธาตุอาหารรองที่พืชมีความต้องการในปริมาณค่อนข้างสูงแต่น้อยกว่าแคลเซียม จากผลวิเคราะห์ din ก่อนการทดลอง (ตารางที่ 6) พบว่าในdin มีปริมาณแมgnีเซียมในปริมาณสูง มีค่าอยู่ระหว่าง 2.92 – 6.52 หลังจากการทดลองในปีที่ 1 (ตารางที่ 6) พบว่า ทุกสำหรับการทดลองในdin มีปริมาณแมgnีเซียมลดลง แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ สำหรับการทดลองที่ 3 การใส่ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ มีปริมาณแมgnีเซียมสูงที่สุดเท่ากับ 0.58 เซนติโมลต่อกรัม สำหรับการทดลองที่ 9 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสดและน้ำหมักชีวภาพ มีปริมาณแมgnีเซียมในdin ต่ำที่สุดเท่ากับ 0.22 เซนติโมลต่อกรัม ซึ่งมีปริมาณแมgnีเซียมในdin ต่ำ สำหรับการทดลองปีที่ 2 (ตารางที่ 6) พบว่าผลวิเคราะห์ din

ก่อนการทดลองในวันมีปริมาณแมgnีเซียมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.28 – 0.54 เชนติโมลต่อกรัม หลังการทดลองพบว่า ในวันมีปริมาณแคลเซียมไม่แตกทางสถิติเช่นเดียวกับผลวิเคราะห์ดินก่อนการทดลอง つまり การทดลองที่ 2 การใส่ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ มีปริมาณแมgnีเซียมสูงที่สุด เท่ากับ 0.49 เชนติโมลต่อกรัม ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง つまりการทดลองที่ 5 การใส่ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ มีปริมาณแมgnีเซียมต่ำที่สุดเท่ากับ 0.25 เชนติโมลต่อกรัม (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 9 ปริมาณแมgnีเซียมที่เป็นประโยชน์ในวันก่อนและหลังการทดลองปีที่ 1 และปีที่ 2

つまりการทดลอง	ปริมาณแมgnีเซียมที่เป็นประโยชน์ ($\text{cmol}(+) \text{kg}^{-1}$)			
	ปีที่ 1		ปีที่ 2	
	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง
つまりที่ 1 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	2.92	0.46	0.28	0.44
つまりที่ 2 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	6.52	0.46	0.41	0.49
つまりที่ 3 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	4.27	0.58	0.36	0.37
つまりที่ 4 ปุ๋ยหมักพด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบทอซังข้าวโพดหวาน	3.08	0.48	0.36	0.45
つまりที่ 5 ปุ๋ยหมักพด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	4.42	0.35	0.33	0.25
つまりที่ 6 ปุ๋ยหมักพด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด และน้ำหมักชีวภาพ	5.32	0.27	0.53	0.35
つまりที่ 7 ปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบทอซังข้าวโพดหวาน	4.15	0.36	0.32	0.34
つまりที่ 8 ปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	3.88	0.50	0.54	0.45
つまりที่ 9 ปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสดและน้ำหมักชีวภาพ	3.75	0.22	0.43	0.35
F-test	ns	ns	ns	ns
CV (%)	30.33	24.49	31.13	38.29

หมายเหตุ ns หมายถึง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ

2. การเจริญเติบโตของข้าวโพดหวาน

2.1 ความสูงต้นข้าวโพดหวาน

งานวิจัยนี้ทำการทดลองเป็นเวลา 2 ปี ได้ทำการเก็บข้อมูลความสูงต้นข้าวโพดโดยการวัดความสูงต้นข้าวโพดจากพื้นดินบริเวณโคนต้นจนถึงฐานใบลง ซึ่งจะเก็บข้อมูลความสูงต้นข้าวโพดก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 วัน จากผลการทดลองปีที่ 1 (ตารางที่ 7 และภาพที่ 1) พบว่า ผลการทดลองในแต่ละつまりการทดลองมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง つまりการทดลองที่ 4 การใส่ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบ มีความสูงต้นข้าวโพดสูงที่สุดเท่ากับ 201.42 ซม. รองลงมาคือつまりการทดลองที่ 5 การใส่ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพมีความสูงต้นข้าวโพดเท่ากับ 189.63 ซม. และつまりการทดลองที่ 6 การใส่ปุ๋ยชีวภาพ


พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุยสด และน้ำหมักชีวภาพ มีความสูงต้นต้าที่สุดเท่ากับ 153.66 ซม. สำหรับผลการทดลองปีที่ 2 (ตารางที่ 7 และภาพที่ 1)พบว่า ความสูงต้นข้าวโพดหวานในแต่ละตำบลการทดลองมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง สำหรับการทดลองที่ 1 ปุยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวานมีความสูงต้นสูงที่สุดเท่ากับ 130.27 ซม. รองลงมาคือตำบลการทดลองที่ 2 การใส่ปุยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ และตำบลการทดลองที่ 3 การใส่ปุยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุยสด ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ มีความสูงเท่ากับ 128.63 และ 128.03 ซม.ตามลำดับ สำหรับการทดลองที่ 7 การใส่ปุยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวานมีความสูงต้นต้าที่สุดเท่ากับ 93.90 ซม.

ตารางที่ 10 ความสูงต้นข้าวโพดหวานปีที่ 1 และปีที่ 2

ตำบลการทดลอง	ความสูงต้น (ซม.)	
	ปีที่ 1	ปีที่ 2
ตำบลที่ 1 ปุยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	186.90 ^d	130.27 ^a
ตำบลที่ 2 ปุยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	162.02 ^h	128.63 ^b
ตำบลที่ 3 ปุยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุยสด	172.83 ^f	128.03 ^b
ตำบลที่ 4 ปุยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	201.42 ^a	106.00 ^e
ตำบลที่ 5 ปุยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	189.63 ^b	107.87 ^d
ตำบลที่ 6 ปุยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุยสด และน้ำหมักชีวภาพ	153.66 ⁱ	102.00 ^f
ตำบลที่ 7 ปุยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	177.45 ^e	93.90 ^g
ตำบลที่ 8 ปุยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	187.93 ^c	107.5 ^{de}
ตำบลที่ 9 ปุยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุยสดและน้ำหมักชีวภาพ	166.75 ^g	109.50 ^c
F-test	**	**
CV (%)	6.85	8.75

หมายเหตุ ** หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง ($P<0.01$)

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเดียวกัน ไม่แตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT



ภาพที่ 1 ความสูงต้นข้าวโพดหวาน

3. ผลผลิตต่อไร่

3.1 น้ำหนักฝักทั้งเปลือกต่อไร่


งานวิจัยนี้ทำการทดลองเป็นเวลา 2 ปี ได้ทำการเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่ (น้ำหนักฝักทั้งเปลือก) ของข้าวโพดหวาน โดยการซึ่งน้ำหนักทั้งเปลือก (Husk leaf) และไหม (Silk) ดูสีเปลือกยังคงสด ใหม่ โดยใช้เครื่องซึ่งที่ได้มาตรฐาน มีหน่วยการซึ่ง grams (กรัม) บันทึกเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง บันทึกข้อมูล จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบร่วมผลผลิตต่อไร่ (น้ำหนักฝักทั้งเปลือก) ปีที่ 1 (ตารางที่ 8 และภาพที่ 2) ทุกตัวรับการทดลองมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง ตัวรับการทดลองที่ 8 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพให้น้ำหนักผลผลิตต่อไร่ (น้ำหนักฝักทั้งเปลือก) สูงที่สุดเท่ากับ 1,514.44 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือตัวรับการทดลองที่ 2 การใส่ปุ๋ยหมักพ.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพให้น้ำหนักผลผลิตต่อไร่ (น้ำหนักฝักทั้งเปลือก) เท่ากับ 1,321.48 กิโลกรัมต่อไร่ และตัวรับการทดลองที่ 6 การใส่ปุ๋ยชีวภาพ พ.ด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ่ยสด และน้ำหมักชีวภาพ ให้น้ำหนักผลผลิตต่อไร่ (น้ำหนักฝักทั้งเปลือก) ต่ำที่สุดเท่ากับ 521.48 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนผลผลิตต่อไร่ (น้ำหนักฝักทั้งเปลือก) ใน การทดลองปีที่ 2 (ตารางที่ 8 และภาพที่ 2) พบร่วมทุกตัวรับการทดลองมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง ตัวรับการทดลองที่ 1 การใส่ปุ๋ยหมักพ.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน ให้น้ำหนักผลผลิตต่อไร่ (น้ำหนักฝักทั้งเปลือก) สูงที่สุดเท่ากับ 823.70 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือตัวรับการทดลองที่ 3 การใส่ปุ๋ยหมักพ.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ่ยสดร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ ให้น้ำหนักผลผลิตต่อไร่ (น้ำหนักฝักทั้งเปลือก) เท่ากับ 766.29 กิโลกรัมต่อไร่ และตัวรับการทดลองที่ 8 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ ให้น้ำหนักผลผลิตต่อไร่ (น้ำหนักฝักทั้งเปลือก) ต่ำที่สุดเท่ากับ 260.74 กิโลกรัมต่อไร่

ตารางที่ 11 น้ำหนักผลผลิตทั้งเปลือกต่อไร่ของข้าวโพดหวานปีที่ 1และปีที่ 2

ตำรับ	การทดลอง	น้ำหนักผลผลิตทั้งเปลือกต่อไร่ (kg)	
		ปีที่ 1	ปีที่ 2
ตำรับที่ 1	ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	1,185.19 ^e	823.70 ^a
ตำรับที่ 2	ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	1,321.48 ^b	634.07 ^c
ตำรับที่ 3	ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	770.37 ^h	766.29 ^b
ตำรับที่ 4	ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	1,226.67 ^d	272.59 ^e
ตำรับที่ 5	ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	800.00 ^g	361.48 ^f
ตำรับที่ 6	ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด และน้ำหมักชีวภาพ	521.48 ⁱ	367.41 ^e
ตำรับที่ 7	ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	1,242.40 ^c	189.63 ⁱ
ตำรับที่ 8	ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	1,514.44 ^a	260.74 ^h
ตำรับที่ 9	ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสดและน้ำหมักชีวภาพ	912.59 ^f	509.63 ^d
F-test		**	**
CV (%)		14.87	8.05

หมายเหตุ ** หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง ($P<0.01$)

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเดียวกัน ไม่แตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT



ภาพที่ 2 น้ำหนักผลผลิตข้าวโพดหวานทั้งเปลือกต่อไร่


3.2 น้ำหนักฝักปอกเปลือกต่อไร่

งานวิจัยนี้ทำการทดลองเป็นเวลา 2 ปี ได้ทำการเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่ (น้ำหนักฝักทั้งเปลือก) ของข้าวโพดหวาน น้ำหนักฝักสดปอกเปลือก คือ การซึ่งน้ำหนักฝักข้าวโพดหวานที่ปอกเปลือก (Husk leaf) ตึงก้าน(Shank) และ ดึงไหม (Silk) ข้าวโพดหวานออกแล้ว โดยใช้เครื่องซึ่งมาตรฐานมีหน่วยชั่งเป็น grams (กรัม) บันทึกเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง บันทึกข้อมูล จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่า ผลผลิตต่อไร่ (น้ำหนักฝักปอกเปลือก) ปีที่ 1 (ตารางที่ 9 และภาพที่ 3) ทุกตัวรับการทดลองมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง ตัวรับการทดลองที่ 8 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ ให้น้ำหนักผลผลิตต่อไร่ (น้ำหนักฝักปอกเปลือก) สูงที่สุดเท่ากับ 1,496.08 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือตัวรับการทดลองที่ 2 การใส่ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพให้น้ำหนักผลผลิตต่อไร่ (น้ำหนักฝักปอกเปลือก) เท่ากับ 1,305.40 กิโลกรัมต่อไร่ และตัวรับการทดลองที่ 6 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด และน้ำหมักชีวภาพให้น้ำหนักผลผลิตต่อไร่ (น้ำหนักฝักปอกเปลือก) ต่ำที่สุดเท่ากับ 510.80 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับผลการทดลองในปีที่ 2 (ตารางที่ 9 และภาพที่ 3) พบว่า ทุกตัวรับการทดลองมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง เช่นเดียวกับผลการทดลองปีที่ 1 โดยตัวรับการทดลองที่ 1 การใส่ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวานให้น้ำหนักผลผลิตต่อไร่ (น้ำหนักฝักปอกเปลือก) สูงที่สุดเท่ากับ 807.34 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือตัวรับการทดลองที่ 3 การใส่ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพให้น้ำหนักผลผลิตต่อไร่ (น้ำหนักฝักปอกเปลือก) เท่ากับ 767.08 กิโลกรัมต่อไร่ และตัวรับการทดลองที่ 7 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวานให้น้ำหนักผลผลิตต่อไร่ (น้ำหนักฝักปอกเปลือก) ต่ำที่สุดเท่ากับ 175.17 กิโลกรัมต่อไร่ ตารางที่ 12 น้ำหนักผลผลิตปอกเปลือกต่อไร่ของข้าวโพดหวานปีที่ 1 และปีที่ 2

ตัวรับการทดลอง	น้ำหนักผลผลิตปอกเปลือกต่อไร่ (kg)	
	ปีที่ 1	ปีที่ 2
ตัวรับที่ 1 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	1,168.82 ^e	807.34 ^a
ตัวรับที่ 2 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	1,305.40 ^b	618.00 ^c
ตัวรับที่ 3 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	761.15 ^h	767.08 ^b
ตัวรับที่ 4 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	1,210.81 ^d	256.73 ^g
ตัวรับที่ 5 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	787.11 ^g	348.59 ^f
ตัวรับที่ 6 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด และน้ำหมักชีวภาพ	510.80 ⁱ	356.33 ^e
ตัวรับที่ 7 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	1,229.99 ^c	175.17 ⁱ
ตัวรับที่ 8 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	1,496.08 ^a	245.74 ^h
ตัวรับที่ 9 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสดและน้ำหมักชีวภาพ	900.94 ^f	497.98 ^d
F-test	**	**
CV (%)	3.01	3.45

หมายเหตุ ** หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.01)

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเดียวกัน ไม่แตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT



ภาพที่ 3 น้ำหนักผลผลิตข้าวโพดหวานปอกเปลือกต่อไร่

4. คุณภาพผลผลิต

งานวิจัยนี้ทำการทดลองเป็นเวลา 2 ปี ได้ทำการเก็บต้นคุณภาพผลผลิตของข้าวโพดหวาน โดยการเก็บข้อมูลความยาวฝัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฝัก และความหวานเมล็ดสดของข้าวโพด

4.1 ความยาวฝักข้าวโพดหวาน

การวัดความยาวฝักข้าวโพดหวาน วัดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่ มกช. 1512-2554 โดยسانักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดว่า ความยาวของฝักปอกเปลือก วัดจากโคนฝักที่ติดเมล็ดถึงปลายฝักที่ติดเมล็ด สำหรับเครื่องมือที่ในการวัดความยาวของฝักข้าวโพดหวาน ที่ใช้กันอยู่

1. ไม้บรรทัด ที่มีองค์เนื้อตัวอักษรที่ขัดเจน มีความคมชัด ตรงได้มาตรฐาน วางลงบนพื้นที่เรียบเสมอ หรือ วางลงบนวัสดุผิวเรียบอีกที่ก่อนทำการวัดความยาว

2. การใช้เครื่องมือที่มีความละเอียด และได้มาตรฐานสำหรับวัดวัสดุรูปทรงกระบวนการ คือ เวอร์เนียร์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบร่วมกับผลการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติในตัวรับการทดลองที่ 8 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ 捺รับการทดลองที่ 1 การใส่ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน 捺รับการทดลองที่ 4 การใส่ ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน 捺รับการทดลองที่ 2 การใส่ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ และ捺รับการทดลองที่ 7 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน มีความยาวฝักเท่ากับ 14.49, 15.17, 15.49 ,15.67 และ 15.67 ซม. ตามลำดับ (ตารางที่ 10) ผลการทดลองมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญใน捺รับการทดลองที่ 5 การใส่ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ 捺รับการทดลองที่ 6 การใส่ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด และน้ำหมักชีวภาพ 捺รับการทดลองที่ 3 การใส่ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ และ捺รับการทดลองที่ 9 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสดและน้ำหมักชีวภาพ มีความยาวฝักเท่ากับ 13.56, 12.54, 12.21 และ 11.77 ซม. ตามลำดับ (ตารางที่ 10)

สำหรับผลการทดลองปีที่ 2 (ตารางที่ 10) พบว่า ทุกตัวรับการทดลองมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง สำหรับการทดลองที่ 3 การใส่ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ่ยสด ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ มีความยาวฝักยาวที่สุดเท่ากับ 12.99 ซม. สำหรับการทดลองที่ 8 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพมีความยาวฝักสั้นที่สุดเท่ากับ 7.76 ซม.

ตารางที่ 13 ขนาดความยาวฝักข้าวโพดหวานปีที่ 1 และปีที่ 2

ตัวรับการทดลอง	ความยาวฝักข้าวโพดหวาน (ซม.)	
	ปีที่ 1	ปีที่ 2
ตัวรับที่ 1 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับปะรดตอซังข้าวโพดหวาน	15.17 ^a	12.48 ^{ab}
ตัวรับที่ 2 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	15.67 ^a	11.86 ^{bc}
ตัวรับที่ 3 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ่ยสด ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	12.21 ^c	12.99 ^a
ตัวรับที่ 4 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับปะรดตอซังข้าวโพดหวาน	15.49 ^a	11.47 ^{cd}
ตัวรับที่ 5 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	13.56 ^b	11.06 ^{cd}
ตัวรับที่ 6 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ่ยสด และน้ำหมักชีวภาพ	12.54 ^{bc}	11.34 ^{cd}
ตัวรับที่ 7 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับปะรดตอซังข้าวโพดหวาน	15.67 ^a	10.83 ^d
ตัวรับที่ 8 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	14.94 ^a	7.76 ^e
ตัวรับที่ 9 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ่ยสดและน้ำหมักชีวภาพ	11.77 ^c	11.18 ^{cd}
F-test	**	**
CV (%)	18.90	14.66

หมายเหตุ ** หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง ($P<0.01$)

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเดียวกัน ไม่แตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT

4.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฝักข้าวโพดหวาน

การวัดเส้นผ่าศูนย์กลางฝักข้าวโพดโดยใช้เครื่องมือการวัดที่เหมาะสมที่สุด คือ เวอร์เนียร์ จะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ได้มาตราฐาน โดยการปอกเปลือกข้าวโพดก่อนทำการวัด นำฝักข้าวโพดใส่ในส่วนขากลางของเวอร์เนียร์ เมื่อทำการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางฝักข้าวโพดเรียบร้อยแล้ว จึงทำการบันทึกข้อมูล จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่า ผลการทดลองปีที่ 1 (ตารางที่ 11) พบว่า ทุกตัวรับการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยตัวรับการทดลองมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใกล้เคียงกันมีค่าอยู่ระหว่าง 3.96 – 4.77 ซม. สำหรับผลการทดลองปีที่ 2 (ตารางที่ 11) พบว่า ผลการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติในตัวรับการทดลองที่ 4 การใส่ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับปะรดตอซังข้าวโพดหวาน ตัวรับการทดลองที่ 2 การใส่ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ ตัวรับการทดลองที่ 9 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ่ยสดและน้ำหมักชีวภาพ ตัวรับการทดลองที่ 9 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ่ยสดและน้ำหมักชีวภาพ

ชีวภาพ สำหรับการทดลองที่ 3 การใส่ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ และสำหรับการทดลองที่ 1 การใส่ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน มีเส้นผ่าศูนย์กลางฝัก 4.16, 4.22, 4.25, 4.28 และ 4.31 ซม. ตามลำดับ ผลการทดลองมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่งในสำหรับการทดลองที่ 8 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ สำหรับทดลองที่ 5 การใส่ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ สำหรับการทดลองที่ 6 การใส่ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด และน้ำหมักชีวภาพ และสำหรับการทดลองที่ 7 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5, 3.77, 3.80 และ 4.08 ซม.ตามลำดับ

ตารางที่ 14 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฝักข้าวโพดหวานปีที่ 1 และปีที่ 2

สำหรับการทดลอง	เส้นผ่าศูนย์กลางฝักข้าวโพดหวาน (ซม.)	
	ปีที่ 1	ปีที่ 2
สำหรับที่ 1 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	4.70	4.31 ^a
สำหรับที่ 2 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	4.73	4.22 ^a
สำหรับที่ 3 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	4.16	4.28 ^a
สำหรับที่ 4 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	4.77	4.16 ^{bc}
สำหรับที่ 5 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	4.46	3.77 ^{bc}
สำหรับที่ 6 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด และน้ำหมักชีวภาพ	4.13	3.80 ^{bc}
สำหรับที่ 7 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	4.57	4.08 ^{ab}
สำหรับที่ 8 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	4.64	3.50 ^c
สำหรับที่ 9 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสดและน้ำหมักชีวภาพ	3.96	4.25 ^a
F-test	ns	**
CV (%)	16.27	9.31

หมายเหตุ ns หมายถึง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ

** หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง ($P<0.01$)

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ต่างกันโดยอักษรเดียวกัน ไม่แตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT

4.3 ความหวานของเมล็ดสดข้าวโพด

การวัดความหวานของข้าวโพดหวาน วัดจากปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Soluble Solids) ในน้ำทึบเมล็ดข้าวโพดหวานสด โดยใช้เครื่องมือ hand refractometer และอ่านค่าเป็นองศาบริกก์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผลการทดลองปีที่ 1 (ตารางที่ 12) พบว่า ทุกสำหรับการทดลองมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ

ยิ่ง โดย捺รับการทดลองที่ 1 การใส่ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน ให้ค่าความหวานของเมล็ดสดสูงที่สุดเท่ากับ 16.27 องศาบริกซ์ ส่วน捺รับการทดลองที่ 2,4,5,6 และ捺รับการทดลองที่ 7 ค่าความหวานของเมล็ดสดไม่มีความแตกต่างทางสถิติ มีค่าความหวานอยู่ระหว่าง 14.80 – 15.60 องศาบริกซ์ สำหรับผลการทดลองปีที่ 2 (ตารางที่ 12) พบว่าทุก捺รับการทดลองมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง 捺รับการทดลองที่ 7 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวานและ捺รับการทดลองที่ 6 การใส่ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด และน้ำหมักชีวภาพมีค่าความหวานของเมล็ดสดสูงที่สุดเท่ากับ 12.77 และ 13.07 องศาบริกซ์ 捺รับการทดลองที่ 3 การใส่ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน มีค่าความหวานของเมล็ดสดต่ำที่สุดเท่ากับ 10.83 และ 10.87 องศาบริกซ์ ตามลำดับ

ตารางที่ 15 ค่าความหวานของเมล็ดข้าวโพดหวาน ปีที่ 1 และปีที่ 2

捺รับการทดลอง	ความหวานของเมล็ดข้าวโพดหวาน (องศาบริกซ์)	
	ปีที่ 1	ปีที่ 2
捺รับที่ 1 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	16.27 ^a	10.87 ^e
捺รับที่ 2 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	15.00 ^{ba}	12.07 ^{bcd}
捺รับที่ 3 ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	14.20 ^c	10.83 ^e
捺รับที่ 4 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	14.80 ^{bc}	12.10 ^{bcd}
捺รับที่ 5 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	14.80 ^{bc}	11.47 ^d
捺รับที่ 6 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด และน้ำหมักชีวภาพ	15.60 ^{ab}	13.07 ^a
捺รับที่ 7 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบตอซังข้าวโพดหวาน	15.00 ^{bc}	12.77 ^a
捺รับที่ 8 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ	14.27 ^c	12.67 ^{ab}
捺รับที่ 9 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสดและน้ำหมักชีวภาพ	14.07 ^c	11.76 ^{cd}
F-test	**	**
CV (%)	16.12	9.72

หมายเหตุ ** หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง ($P<0.01$)


ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเดียวกัน ไม่แตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น

95% โดยวิธี DMRT

5. ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าวโพดหวานในแต่ละตำบลการทดลอง ได้ทำ การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีที่ 1 และ 2 ดังแสดงในตารางที่ 13 จำนวนนำมารวบรวมทั้งหมด 13,871.80 บาท ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ เป็นตำบลการทดลองที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงที่สุด มีมูลค่าผลผลิตและผลตอบแทนเท่ากับ 17,671.80 และ 13,871.80 บาทต่อไร่ ตามลำดับ รองลงมาคือตำบล การทดลองที่ 4 การใส่ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบทอซึ่งข้าวโพดหวาน มีมูลค่าผลผลิต และผลตอบแทนเท่ากับ 14,992.60 และ 12,292.60 บาทต่อไร่ ตามลำดับ (ตารางที่ 14)

จะเห็นได้ว่าตำบลการทดลองที่ 1 การใส่ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบทอซึ่ง ข้าวโพดหวาน มีน้ำหมักผลผลิต(กิโลกรัมต่อไร่)และมูลค่าผลผลิตสูงที่สุดเท่ากับ 1,004.45 กิโลกรัมต่อไร่ 20,089.00 บาทต่อไร่ รองลงมาคือตำบลการทดลองที่ 2 การใส่ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ มี น้ำหมักผลผลิต(กิโลกรัมต่อไร่)และมูลค่าผลผลิตเท่ากับ 977.78 กิโลกรัมต่อไร่ และ 19,555.60 บาทต่อไร่ แต่เมื่อ วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต พบว่า ทั้งตำบลการทดลองที่ 1 และตำบลการทดลองที่ 2 มีการใส่ปุ๋ยหมัก พด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าตำบลการทดลองอื่น ๆ (ตารางที่ 13 และภาพที่ 4)



ภาพที่ 4 ผลผลิตข้าวโพดหวาน (กิโลกรัม/ไร่)

ตารางที่ 16 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจรวม 2 ปี

รายการ	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
1. ค่าแรง									
-ค่าไถ่เตรียมдин	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2. ค่าวัสดุ									
-ค่าเมล็ดพันธุ์	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
-ค่าปุ๋ยหมักพด.1	6,800.00	6,800.00	6,800.00	-	-	-	-	-	-
-ค่าปุ๋ยชีวภาพ	-	-	-	1,050.00	1,050.00	1,050.00	-	-	-
-ค่าปุ๋ยคุณภาพสูง	-	-	-	-	-	-	1,710.00	1,710.00	1,710.00
-ค่าน้ำหมักพด.2	-	440.00	440.00	-	440.00	440.00	-	440.00	440.00
ต้นทุนผันแปร	8,450.00	8,890.00	8,890.00	2,700.00	3,140.00	3,140.00	3,360.00	3,800.00	3,800.00
ผลผลิต	1,004.45	977.78	768.33	749.63	580.74	444.45	716.02	883.59	711.11
(กิโลกรัมต่อไร่)									
ราคาผลผลิต	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
(บาทต่อ กิโลกรัม)									
มูลค่าผลผลิต	20,089.00	19,555.60	15,366.60	14,992.60	11,614.80	8,889.00	14,320.40	17,671.80	14,222.20
(บาทต่อไร่)									
ผลตอบแทน	11,639.00	10,665.60	6,476.60	12,292.60	8,474.80	5,749.00	10,960.40	13,871.80	10,422.20
(บาทต่อไร่)									

ตารางที่ 17 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

ลำดับที่	ต้นทุน ผันแปร (บาท/ไร่)	ผลผลิต (กก./ไร่)	ราคาผลผลิต (บาท/กก.)	มูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่)	ต้นทุน การผลิต (บาท/กก.)	ผลตอบแทน (บาท/ไร่)
1	8,450.00	1,004.45	20.00	20,089.00	8	11,639.00
2	8,890.00	977.78	20.00	19,555.60	9	10,665.60
3	8,890.00	768.33	20.00	15,366.60	11	6,476.60
4	2,700.00	749.63	20.00	14,992.60	4	12,292.60
5	3,140.00	580.74	20.00	11,614.80	5	8,474.80
6	3,140.00	444.45	20.00	8,889.00	7	5,749.00
7	3,360.00	716.02	20.00	14,320.40	5	10,960.40
8	3,800.00	883.59	20.00	17,671.80	4	13,871.80
9	3,800.00	711.11	20.00	14,222.20	5	10,422.20

สรุปผลการทดลอง

**จากการศึกษาการจัดการอินทรีย์วัตถุในดินเพื่อการผลิตข้าวโพดหวานในระบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสตูล
สรุปผลการทดลองได้ดังนี้**

1. การศึกษาสมบัติทางเคมีของดิน พบร้า คุณสมบัติทางเคมีของดินทั้งก่อนและหลังการทดลอง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยหลังการทดลองในปีที่ 1 ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยกระดับค่าความเป็นกรดเป็นด่างในดินให้สูงขึ้น แต่ค่าความเป็นกรดเป็นด่างยังอยู่ในระดับกรดจัด เช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์ดินในปีที่ 2 พบร้า ผลวิเคราะห์ทุกตัวรับการทดลองพบว่าดินมีแนวโน้มมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างลดลง แต่ยังค่าอยู่ในระดับกรดจัด ดังนั้นการใส่ปุ๋ยหมัก พด.1 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินเพียงเล็กน้อย สับกลบทอซังข้าวโพดหวานทำให้ดินมีปริมาณอินทรีย์ (OM) ปริมาณแคลเซียม (Ca) และปริมาณแมgnesi เซียม (Mg) ในดินเพิ่มขึ้น ดินมีปริมาณฟอฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available K) ลดลงทุกตัวรับการทดลอง

2. การเจริญเติบโต พบร้าการใส่ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบทอซังข้าวโพดหวานทำให้ความสูงต้นข้าวโพดหวานมีแนวโน้มสูงกว่าตัวรับการทดลองอื่น ๆ

3. จากการเก็บข้อมูลผลผลิต(กิโลกรัมต่อไร่)ในการทดลองปีที่ 1 และ ปีที่ 2 พบร้าการใส่ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบทอซังข้าวโพดหวาน มีแนวโน้มให้น้ำหนักผลผลิต(กิโลกรัมต่อไร่)สูงกว่าตัวรับการทดลองอื่น ๆ

4. จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพผลผลิตข้าวโพดหวาน พบร้า ตัวรับการทดลองที่ 1, 4 และตัวรับการทดลองที่ 7 ที่การสับกลบทอซังข้าวโพดมีแนวโน้มให้ความยาวฝักยาวกว่าตัวรับการทดลองอื่น ๆ การใส่ปุ๋ยหมัก พด.1, ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ไม่มีผลต่อเส้นผ่าศูนย์ฝักข้าวโพดหวาน ปุ๋ยหมักพด.1 และปุ๋ยชีวภาพ พด.12 มีแนวโน้มให้ค่าความหวานมีลักษณะดีกว่าตัวรับการทดลองอื่น ๆ

5. การใส่ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกับสับกลบทอซังข้าวโพดหวาน มีน้ำหนักผลผลิต(กิโลกรัมต่อไร่) และมูลค่าผลผลิตสูงที่สุดเท่ากับ 1,004.45 กิโลกรัมต่อไร่ 20,089.00 บาทต่อไร่ แต่เนื่องจากมีการใส่ปุ๋ยหมักพด.1 อัตรา 2,000 กก.ต่อไร่ ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจน้อยกว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นตัวรับการทดลองที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงที่สุด มีมูลค่าผลผลิตและผลตอบแทนเท่ากับ 17,671.80 และ 13,871.80 บาทต่อไร่ ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ

1. ช่วงเวลาในการทำการทดลองควรเลือกช่วงเวลาให้เหมาะสม ควรหลีกเลี่ยงช่วงหน้าฝน โดยเฉพาะการเลือกข้าวโพดหวานเป็นพืชในการทดลอง พบร้าในการทดลองปีที่ 2 ช่วงที่ทำการทดลองมีฝนตกหนัก เมื่อฝนได้ชะล้างปุ๋ยที่ใส่ในแปลงทดลองออกหมด ทำให้ข้าวโพดหวานได้รับปุ๋ยไม่เต็มที่ มีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของข้าวโพดหวาน

2. การวางแผนการทดลองควรคำนึงถึงความต้องปริมาณธาตุอาหารของพืชมาใช้ร่วมกับการวางแผนการทดลองด้วย เพื่อให้พืชที่เลือกใช้ในการทดลองมีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

3. การเลือกใช้ปุ๋ยในการทดลอง ควรเลือกใช้ปุ๋ยที่มีปริมาณธาตุอาหารเพียงพอ กับความต้องการปริมาณธาตุอาหารพืช เพื่อให้พืชสามารถนำมาราใช้ในการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้แนวทางการจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก พด.1, ปุ๋ยชีวภาพ พด.12, ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ เพื่อปลูกข้าวโพดหวานในระบบเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดสตูล
2. เกษตรกรสามารถเลือกวิธีการจัดการดินและนำมาระบุกด้วยให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ทำให้เกิดความคุ้มค่าทั้งในด้านการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดหวาน และการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
3. ทราบถึงปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อใช้กำหนดเป็นอัตราคำแนะนำการใส่ที่ถูกต้อง

การเผยแพร่องานวิจัย

เมื่อผลการดำเนินการวิจัยสิ้นสุดจะได้วิเคราะห์ที่เหมาะสมในการจัดการอินทรีย์วัตถุในดินเพื่อการผลิตข้าวโพดหวานในระบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสตูลเพิ่มผลผลิต และนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมพัฒนาที่ดิน คู่มือการผลิต สงเสริม การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านเครือข่ายท้องดินอาสา กลุ่มเกษตรกร เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เอกสารอ้างอิง

กรมพัฒนาที่ดิน. 2548. รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน: เล่มที่ 2 ดินบนพื้นที่ดอน. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

กรมพัฒนาที่ดิน. 2548. ลักษณะและคุณสมบัติของชุดดินในภาคใต้และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย. กรมพัฒนาที่ดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ.

กรมพัฒนาที่ดิน. 2551. คู่มือการการจัดการอินทรีย์ดินเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน. กรมพัฒนาที่ดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

กรมพัฒนาที่ดิน. 2551. เอกสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชุดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน. สำนักนิเทศ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน. กรมพัฒนาที่ดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2 หน้า

กรมพัฒนาที่ดิน. 2553. คู่มือการพัฒนาที่ดินสำหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร. กรมพัฒนาที่ดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

กรมวิชาการเกษตร. 2547. เอกสารวิชาการ ข้าวโพดฝักสด. กรมวิชาการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ.

กรมวิชาการเกษตร. 2548. ปุ๋ยชีวภาพและผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ. ศรีเมืองการพิมพ์. กรุงเทพฯ.

กรมพัฒนาที่ดิน. 2547 คู่มือการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย พืช วัสดุปรับปรุงดิน และการวิเคราะห์เพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร. เล่มที่ 1. สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน. กรมพัฒนาที่ดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ชูศักดิ์ จอมพุก. 2542. พืชเศรษฐกิจ. ภาควิชาไร่นา. คณะเกษตร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. ทิพย์ เรขกุล.

2547. เกษตรดีที่เมืองสมสำหรับข้าวโพดหวาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. สถาบันวิจัยพืชไร่. กรมวิชาการเกษตร. ก ร ง ท ร ว ง เกษตรและสหกรณ์.

มุกดา สุขสวัสดิ์. 2545. ชุดคู่มือการเกษตรปุ๋ยอินทรีย์. พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. พิมพ์ทีบริษัท อมรินทร์พิริย์ ตั้งแอนเดอร์พับลิชิ่ง จำกัด. กรุงเทพฯ.

วนิดา พานิกรและ ศิวพร ศิลเดโช. 2560 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโม ในดินทรายชุดดินบ้านไผ่ จังหวัดมหาสารคาม. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.

วิเชียร จาภูพจน์. 2548 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

วุฒิชาติ ศิริช่วยชู. 2550. เอกสารวิชาการฉบับที่ 20/03/500 ฐานข้อมูลดินภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ดิน. กรมพัฒนาที่ดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ.

วรรณลดा สุนัน พงศ์ศักดิ์. 2537. ผลงานการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการปรับปรุงดินในแนวทางการเกษตรยั่งยืน. กรมพัฒนาที่ดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ.

ศุนย์วิจัยพืชไร่ส่งขลา. ไม่ระบุปี พ.ศ. คำแนะนำการปลูกพืชไร่ที่มีศักยภาพในภาคใต้. เทมการพิมพ์. สถาบันวิจัยพืชไร่. กรมวิชาการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สถาบันพืชไร่. 2547. การปลูกพืชไร่. กรมวิชาการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ.

สุวรรณภา บุญจรักษา วรรณภา สุวรรณวิจิตรและ กัญญาพร สังข์แก้ว. 2559 ผลของการใช้วัสดุอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ พด. 12 ในการปรับปรุงดินเค็มเพื่อปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.

[http://www.thaimallplaza.com/center/website/management/website_dragdrop/index_menu.php?sit_e=457&page_id=8812&control=\(ข้อมูลตำบลท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล : วันที่สืบค้น 8 มิ.ย. 2558\)](http://www.thaimallplaza.com/center/website/management/website_dragdrop/index_menu.php?sit_e=457&page_id=8812&control=(ข้อมูลตำบลท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล : วันที่สืบค้น 8 มิ.ย. 2558))

- [http://www.thaimallplaza.com/center/website/management/website_dragdrop/index_menu.php?sit_e=457&page_id=8813&control=\(ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศไทย ตำบลท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล : วันที่ สืบคัน 8 มิ.ย. 2558\)](http://www.thaimallplaza.com/center/website/management/website_dragdrop/index_menu.php?sit_e=457&page_id=8813&control=(ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศไทย ตำบลท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล : วันที่ สืบคัน 8 มิ.ย. 2558))
- [http://www.cornthai.com/news-204.html \(ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวโพดหวานของไทย: วันที่สืบคัน 9 มิ.ย. 2558\)](http://www.cornthai.com/news-204.html)
- [http://mgr.manager.co.th/SMEs/ViewNews.aspx?NewsID=9530000165014 \("ข้าวโพดหวานแปรรูปของไทย" อนาคตไก่ในตลาดโลก: วันที่สืบคัน 9 มิ.ย. 2558 \)](http://mgr.manager.co.th/SMEs/ViewNews.aspx?NewsID=9530000165014)
- [http://www.dld.go.th/inform/article/artileg.html \(การใช้เศษวัสดุเหลือใช้ของข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวานเป็นอาหารสัตว์: วันที่สืบคัน 9 มิ.ย. 2558 \)](http://www.dld.go.th/inform/article/artileg.html)
- [http://www.oae.go.th/ewtadmin/ewt/oae_baer/ewt_news.php?nid=407&filename=index \(อนาคต อุสาหกรรมข้าวโพดหวานของไทย: วันที่สืบคัน 9 มิ.ย. 2558 \)](http://www.oae.go.th/ewtadmin/ewt/oae_baer/ewt_news.php?nid=407&filename=index)
- [http://www.pg4u.net/content.php?id=42 \(การปลูกพืชแซมยางพารา: วันที่สืบคัน 10 มิ.ย. 2558\)](http://www.pg4u.net/content.php?id=42)

ภาคผนวก

ตารางภาคผนวกที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ใช้ในการทดลอง ปีที่ 1

ชนิดปุ๋ย	pH	EC (ds/m)	OM (%)	Total N (%)	P ₂ O ₃ (%)	K ₂ O (%)	C/N
ปุ๋ยหมัก พด.1	7.0	2.24	23.65	1.24	2.37	0.65	11.06
ปุ๋ยชีวภาพ พด.12	7.2	2.38	34.86	1.30	2.73	0.77	15.55
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	7.3	12.03	57.80	5.01	2.75	4.48	6.69

ตารางภาคผนวกที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ใช้ในการทดลอง ปีที่ 2

ชนิดปุ๋ย	pH	EC (ds/m)	OM (%)	Total N (%)	P ₂ O ₃ (%)	K ₂ O (%)	C/N
ปุ๋ยหมัก พด.1	7.1	2.28	24.01	1.31	2.45	0.68	12.01
ปุ๋ยชีวภาพ พด.12	7.2	2.42	35.62	1.45	2.81	0.79	14.47
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	7.4	12.33	58.64	5.32	2.85	5.01	6.72

ตารางภาคผนวกที่ 3 พิสัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินระดับสมบัติทางเคมีของดิน

สมบัติทางเคมีของดิน	ระดับ
ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (1:1 Soil: H ₂ O)	< 4.6 กรณรุนแรง 4.5 - 5.5 กรณจัด 5.6 - 6.5 กรณเล็กน้อย 6.6 - 7.3 กลาง 7.4 - 8.4 ด่างเล็กน้อย > 8.4 ด่างจัด
ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (%)	< 0.5 ต่ำมาก 0.5 - 1.0 ต่ำ 1.1 - 1.5 ค่อนข้างต่ำ 1.6 - 2.5 ปานกลาง 2.6 - 3.5 ค่อนข้างสูง 3.6 - 4.5 สูง > 4.5 สูงมาก
ปริมาณฟอสฟอรัส (mg kg ⁻¹)	< 7 ต่ำมาก 7 - 12 ต่ำ 13 - 24 ปานกลาง 25 - 50 สูง > 50 สูงมาก

ที่มา : สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน.2547

ตารางภาคผนวกที่ 3 พิสัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินระดับสมบัติทางเคมีของดิน (ต่อ)

สมบัติทางเคมีของดิน		ระดับ
ปริมาณโพแทสเซียม (mg kg^{-1})	< 16	ต่ำมาก
	16 - 30	ต่ำ
	30 - 60	ปานกลาง
	60 - 120	สูง
	> 120	สูงมาก
ปริมาณแคลเซียม (cmol kg^{-1})	< 2.0	ต่ำ
	2.0 – 5.0	ปานกลาง
	10.0 –	สูง
	> 200	สูงมาก
ปริมาณแมกนีเซียม (cmol kg^{-1})	< 0.3	ต่ำ
	0.3 – 1.0	ปานกลาง
	1.0 – 8.0	สูง
	> 8.0	สูงมาก

ที่มา : สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน.2547

ตารางภาคผนวกที่ 4 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าความเป็นกรดเป็นด่างก่อนการทดลองปีที่ 1

Source	df	SS	MS	F
Block	2	0.685	0.343	
Treatment	8	18.987	2.373	1.177 ^{ns}
Error	16	32.261	2.016	
Total	27	677.860		
Grand mean		4.8148		

ตารางภาคผนวกที่ 5 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าความเป็นกรดเป็นด่างหลังการทดลองปีที่ 1

Source	df	SS	MS	F
Block	2	2.027	1.013	
Treatment	8	2.707	0.338	1.400 ^{ns}
Error	16	3.867	0.242	
Total	27	738.680		
Grand mean		5.200		

ตารางภาคผนวกที่ 6 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าความเป็นกรดเป็นด่างก่อนการทดลองปีที่ 2

Source	df	SS	MS	F
Block	2	0.325	0.163	
Treatment	8	0.890	0.111	0.784 ^{ns}
Error	16	2.268	0.142	
Total	27	839.00		
Grand mean		5.5630		

ตารางภาคผนวกที่ 7 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าความเป็นกรดเป็นด่างหลังการทดลองปีที่ 2

Source	df	SS	MS	F
Block	2	0.401	0.236	
Treatment	8	0.472	0.50	0.455 ^{ns}
Error	16	1.761	0.110	
Total	27	765.310		
Grand mean		5.3148		

ตารางภาคผนวกที่ 8 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอินทรีย์วัตถุในdin ก่อนการทดลองปีที่ 1

Source	df	SS	MS	F
Block	2	0.070	0.035	
Treatment	8	7.185	0.898	0.666 ^{ns}
Error	16	21.579	1.349	
Total	27	153.986		
Grand mean		2.1530		

ตารางภาคผนวกที่ 9 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอินทรีย์วัตถุในdin หลังการทดลองปีที่ 1

Source	df	SS	MS	F
Block	2	0.284	0.142	
Treatment	8	0.180	0.022	0.364 ^{ns}
Error	16	0.989	0.062	
Total	27	72.089		
Grand mean		1.6737		

ตารางภาคผนวกที่ 10 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอินทรีย์วัตถุในдинก่อนการทดลองปีที่ 2

Source	df	SS	MS	F
Block	2	0.121	0.061	
Treatment	8	0.222	0.028	0.461 ^{ns}
Error	16	0.966	0.060	
Total	27	69.537		
Grand mean		1.5896		

ตารางภาคผนวกที่ 11 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอินทรีย์วัตถุในдинหลังการทดลองปีที่ 2

Source	df	SS	MS	F
Block	2	0.091	0.045	
Treatment	8	0.412	0.051	1.098 ^{ns}
Error	16	0.750	0.047	
Total	27	59.980		
Grand mean		1.4748		

ตารางภาคผนวกที่ 12 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณฟ้อสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในдинก่อนการทดลองปีที่ 1

Source	df	SS	MS	F
Block	2	5722.889	2861.444	
Treatment	8	2551521.333	318940.167	2.021 ^{ns}
Error	16	2525068.444	157816.778	
Total	27	7736874.000		
Grand mean		313.5556		

ตารางภาคผนวกที่ 13 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณฟ้อสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในдинหลังการทดลองปีที่ 1

Source	df	SS	MS	F
Block	2	2781.630	1390.815	
Treatment	8	5305.185	663.148	1.295 ^{ns}
Error	16	8192.370	512.023	
Total	27	29657.000		
Grand mean		22.2593		

ตารางภาคผนวกที่ 14 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินก่อนการทดลองปีที่ 2

Source	df	SS	MS	F
Block	2	72.667	36.333	
Treatment	8	310.000	38.750	0.468 ^{ns}
Error	16	1324.000	82.750	
Total	27	10563.000		
Grand mean		18.1111		

ตารางภาคผนวกที่ 15 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินหลังการทดลองปีที่ 2

Source	df	SS	MS	F
Block	2	1420.074	710.037	
Treatment	8	3589.630	448.704	0.894 ^{ns}
Error	16	8031.259	501.954	
Total	27	19985.000		
Grand mean		16.0370		

ตารางภาคผนวกที่ 16 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินก่อนการทดลองปีที่ 1

Source	df	SS	MS	F
Block	2	32792.667	16396.33	
Treatment	8	157949.333	19743.667	0.790 ^{ns}
Error	16	399732.667	24983.293	
Total	27	1305883.000		
Grand mean		162.7778		

ตารางภาคผนวกที่ 17 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินหลังการทดลองปีที่ 1

Source	df	SS	MS	F
Block	2	11843.556	5921.778	
Treatment	8	4437.333	554.667	0.448 ^{ns}
Error	16	19791.111	1236.944	
Total	27	144372.000		
Grand mean		63.3333		

ตารางภาคผนวกที่ 18 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินก่อนการทดลองปีที่ 2

Source	df	SS	MS	F
Block	2	1862.296	931.148	
Treatment	8	2044.296	255.0537	0.737 ^{ns}
Error	16	5551.037	346.940	
Total	27	99360.000		
Grand mean		57.7037		

ตารางภาคผนวกที่ 19 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินหลังการทดลองปีที่ 2

Source	df	SS	MS	F
Block	2	275.630	137.815	
Treatment	8	2509.407	313.676	1.134 ^{ns}
Error	16	4424.370	276.523	
Total	27	61525.000		
Grand mean		44.8519		

ตารางภาคผนวกที่ 20 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณแคลเซียมในดินก่อนการทดลองปีที่ 1

Source	df	SS	MS	F
Block	2	17.239	8.620	
Treatment	8	816.897	102.112	0.504 ^{ns}
Error	16	3240.991	202.562	
Total	27	26373.919		
Grand mean		28.7381		

ตารางภาคผนวกที่ 21 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณแคลเซียมในดินหลังการทดลองปีที่ 1

Source	df	SS	MS	F
Block	2	5.591	2.795	
Treatment	8	4.533	0.567	0.869 ^{ns}
Error	16	10.434	0.652	
Total	27	73.533		
Grand mean		1.4007		

ตารางภาคผนวกที่ 22 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณแคลเซียมในдинก่อนการทดลองปีที่ 2

Source	df	SS	MS	F
Block	2	3.972	1.986	
Treatment	8	8.712	1.089	1.956 ^{ns}
Error	16	8.908	0.557	
Total	27	127.838		
Grand mean		1.9837		

ตารางภาคผนวกที่ 23 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณแคลเซียมในдинหลังการทดลองปีที่ 2

Source	df	SS	MS	F
Block	2	2.896	1.448	
Treatment	8	7.348	0.919	1.252 ^{ns}
Error	16	11.741	0.734	
Total	27	137.470		
Grand mean		2.0137		

ตารางภาคผนวกที่ 24 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณแมgnีเซียมในдинก่อนการทดลองปีที่ 1

Source	df	SS	MS	F
Block	2	9.874	4.937	
Treatment	8	29.500	3.687	0.559 ^{ns}
Error	16	105.529	6.596	
Total	27	634.122		
Grand mean		4.2567		

ตารางภาคผนวกที่ 25 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณแมgnีเซียมในдинหลังการทดลองปีที่ 1

Source	df	SS	MS	F
Block	2	0.422	0.211	
Treatment	8	0.334	0.042	0.829 ^{ns}
Error	16	0.806	0.050	
Total	27	6.109		
Grand mean		0.4104		

ตารางภาคผนวกที่ 26 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณแมกนีเซียมในдинก่อนการทดลองปีที่ 2

Source	df	SS	MS	F
Block	2	0.008	0.004	
Treatment	8	0.208	0.026	1.595 ^{ns}
Error	16	0.261	0.016	
Total	27	4.935		
Grand mean		0.4063		

ตารางภาคผนวกที่ 27 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณแมกนีเซียมในдинหลังการทดลองปีที่ 2

Source	df	SS	MS	F
Block	2	0.036	0.018	
Treatment	8	0.129	0.016	0.766 ^{ns}
Error	16	0.336	0.021	
Total	27	4.369		
Grand mean		0.3785		

ตารางภาคผนวกที่ 28 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงต้นข้าวโพด ปีที่ 1

Source	df	SS	MS	F
Block	2	2.586	1.293	
Treatment	8	5585.105	698.138	838.406 ^{**}
Error	16	13.323	0.833	
Total	27	85744.5220		
Grand mean		177.6226		

ตารางภาคผนวกที่ 29 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงต้นข้าวโพด ปีที่ 2

Source	df	SS	MS	F
Block	2	2.340	1.170	
Treatment	8	4112.973	514.122	596.660 ^{**}
Error	16	13.787	0.862	
Total	27	346658.330		
Grand mean		112.6333		

ตารางภาคผนวกที่ 30 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ำหนักผลผลิตข้าวโพดทั้งเปลือกต่อไร่ ปีที่ 1

Source	df	SS	MS	F
Block	2	57.406	28.703	
Treatment	8	2443827.973	305478.497	13089.877**
Error	16	373.392	23.337	
Total	27	32493739.41		
Grand mean		1054.9615		

ตารางภาคผนวกที่ 31 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ำหนักผลผลิตข้าวโพดทั้งเปลือกต่อไร่ ปีที่ 2

Source	df	SS	MS	F
Block	2	1.358	0.679	
Treatment	8	1292844.352	161605.544	53437.240**
Error	16	48.387	3.024	
Total	27	7160459.346		
Grand mean		446.1730		

ตารางภาคผนวกที่ 32 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ำหนักผลผลิตข้าวโพดหลังปอกเปลือกต่อไร่ ปีที่ 1

Source	df	SS	MS	F
Block	2	1.969	0.985	
Treatment	8	2404208.385	300526.048	318176.133**
Error	16	15.112	0.945	
Total	27	31676834.66		
Grand mean		1041.2352		

ตารางภาคผนวกที่ 33 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ำหนักผลผลิตข้าวโพดหลังปอกเปลือกต่อไร่ ปีที่ 2

Source	df	SS	MS	F
Block	2	1.124	0.562	
Treatment	8	1296910.287	162113.786	300392.279**
Error	16	8.635	0.540	
Total	27	6827619.632		
Grand mean		452.5933		

ตารางภาคผนวกที่ 34 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวฝึกข้าวโพด ปีที่ 1

Source	df	SS	MS	F
Block	2	0.979	0.490	
Treatment	8	61.447	7.681	15.233**
Error	16	8.067	0.504	
Total	27	5448.520		
Grand mean		14.1133		

ตารางภาคผนวกที่ 35 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวฝึกข้าวโพด ปีที่ 2

Source	df	SS	MS	F
Block	2	0.050	0.025	
Treatment	8	52.132	6.516	27.066**
Error	16	3.852	0.241	
Total	27	3455.021		
Grand mean		11.2200		

ตารางภาคผนวกที่ 36 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนเส้นผ่าศูนย์กลางฝึกข้าวโพด ปีที่ 1

Source	df	SS	MS	F
Block	2	0.801	0.401	
Treatment	8	2.165	0.271	2.299 ^{ns}
Error	16	1.884	0.118	
Total	27	541.567		
Grand mean		4.4585		

ตารางภาคผนวกที่ 37 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนเส้นผ่าศูนย์กลางฝึกข้าวโพด ปีที่ 2

Source	df	SS	MS	F
Block	2	0.002	0.001	
Treatment	8	1.941	0.243	6.985**
Error	16	0.556	0.035	
Total	27	443.425		
Grand mean		4.0411		

ตารางภาคผนวกที่ 38 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนความหวานของข้าวโพด ปีที่ 1

Source	df	SS	MS	F
Block	2	0.009	0.004	
Treatment	8	13.227	1.653	4.245**
Error	16	6.231	0.389	
Total	27	6076.480		
Grand mean		14.9778		

ตารางภาคผนวกที่ 39 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนความหวานของข้าวโพด ปีที่ 2

Source	df	SS	MS	F
Block	2	0.060	0.030	
Treatment	8	15.453	1.932	17.044**
Error	16	1.813	0.113	
Total	27	3876.580		
Grand mean		11.9556		

